



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda
Ospedaliero Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 01

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 Individuare il comportamento corretto relativamente al digiuno preoperatorio.**
- A** L'indicazione non è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, al tipo di alimenti, all'età e alle condizioni respiratorie del paziente e il digiuno deve iniziare sempre almeno 8 ore prima dell'intervento chirurgico
 - B** L'indicazione è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, al tipo di alimenti, all'età e alle condizioni respiratorie del paziente
 - C** L'indicazione non è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, al tipo di alimenti, all'età e alle condizioni respiratorie del paziente e il digiuno deve iniziare sempre almeno 12 ore prima dell'intervento chirurgico
 - D** L'indicazione è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, alle condizioni respiratorie del paziente e alla terapia farmacologica prescritta e assunta
-
- 2 L'ormone prodotto dal trofoblasto è:**
- A** la gonadotropina corionica
 - B** il progesterone
 - C** l'estriolo
 - D** il cortisolo
-
- 3 Quale fra questi farmaci NON è un FANS?**
- A** Acido acetilsalicilico
 - B** Ibuprofene
 - C** Indometacina
 - D** Paracetamolo
-
- 4 In un paziente in posizione supina, le zone maggiormente a rischio di lesioni da pressione sono:**
- A** malleoli interni, orecchie e naso
 - B** fronte, mento, torace, ginocchia e metacarpi
 - C** occipite, regione sacrale, scapole, gomiti e talloni
 - D** ginocchio, trocantere e orecchio, nel lato di appoggio
-
- 5 L'elettroencefalogramma serve a:**
- A** indagare la morfologia degli emisferi cerebrali
 - B** misurare l'attività elettrica cerebrale
 - C** avere informazioni sull'attività metabolica dei neuroni
 - D** valutare il flusso ematico cerebrale
-
- 6 La prevenzione delle complicanze tromboemboliche nella persona operata si basa su tutte le seguenti prestazioni TRANNE una: quale?**
- A** Mantenere la persona a letto
 - B** Far svolgere esercizi attivi o passivi degli arti inferiori durante la permanenza a letto
 - C** Applicare calze elastiche durante la permanenza a letto
 - D** Idratare il paziente
-

È opportuno che la persona diabetica in trattamento insulinico svolga attività fisica. Quali informazioni le saranno fornite per consentirle di svolgerla senza rischi di complicanze?

- A** È da rimandare se le urine contengono nitriti
 - B** È consigliabile svolgerla sempre alla stessa ora della giornata
 - C** È preferibile non assumere alimenti prima di effettuarla
 - D** È consigliabile eseguire l'autocontrollo glicemico prima di iniziare
-

8 Se il colore delle urine ha l'aspetto definito "lavatura di carne", si è in presenza di:

- A** nicturia
 - B** ematuria
 - C** piuria
 - D** stranguria
-

9 Per ottenere l'effetto desiderato dei disinfettanti si devono osservare regole ben precise. Quale tra i seguenti sistemi di conservazione NON è corretto?

- A** Apporre la data di apertura sulla confezione
 - B** Conservare il prodotto in luoghi freschi e asciutti
 - C** Non appoggiare mai sull'apertura della confezione garze, cotone, mani, ecc.
 - D** Lasciare aperta la confezione
-

10 La scala di Oucher viene utilizzata per quantificare il dolore nei pazienti:

- A** con dolore cronico
 - B** anziani
 - C** adolescenti
 - D** pediatrici
-

11 Secondo la normativa inerente al Profilo professionale (d.m. Sanità 739/1994), con responsabilità dell'infermiere, ci si riferisce:

- A** alla sola obbligatorietà alla formazione continua
 - B** all'assistenza generale infermieristica
 - C** alla sola responsabilità penale che deriva dall'esercizio della professione
 - D** a nessuna delle altre alternative
-

12 L'infermiere dovrebbe sospettare una disidratazione se l'anziano che assiste manifesta:

- A** aumento della pressione arteriosa, dolore osteoarticolare, debolezza
 - B** mal di testa, comparsa di arrossamento cutaneo, difficoltà nel parlare
 - C** diminuzione della temperatura corporea, comparsa di brividi, delirio ed ematemesi
 - D** riduzione della pressione arteriosa, aumento repentino del peso corporeo e della diuresi
-

-
- 13 Dovendo disinfettare una ferita lacero-contusa sporca di terra, è opportuno utilizzare:
- A** alcol denaturato
 - B** acqua fredda corrente
 - C** acqua calda corrente
 - D** acqua ossigenata
-
- 14 Nell'assistenza durante l'esame pelvico, in quale decubito si dovrà fare posizionare la donna?
- A** Posizione prona
 - B** Posizione genupettorale
 - C** Posizione supina
 - D** Posizione litotomica
-
- 15 È stato appena posizionato un sondino naso-gastrico per nutrizione enterale a un giovane in stato di incoscienza a seguito di un trauma cranico. Dopo la verifica tramite radiografia del corretto posizionamento della sonda, come l'infermiere dovrebbe gestire l'avvio dell'alimentazione?
- A** Inizia dopo circa 48 ore la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla la pervietà del sondino e verifica la comparsa di febbre e dispnea
 - B** Inizia dopo 48 ore la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla al termine di ogni miscela la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di vomito e diarrea
 - C** Inizia la miscela nutritiva a un flusso di 50 ml/h in infusione continua, controlla ogni 3 ore la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di rigurgito e diarrea
 - D** Inizia la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla dopo 4-5 ore la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di tosse e dispnea
-
- 16 Tra i criteri generali per la terapia del dolore, c'è l'importanza di somministrare i farmaci:
- A** prima delle ore notturne
 - B** prima che compaia il dolore
 - C** al bisogno
 - D** solo se il dolore è insopportabile
-
- 17 Come si rileva la temperatura differenziale in un paziente?
- A** Calcolando la differenza di temperatura tra rilevazione rettale eseguita al mattino e rilevazione ascellare eseguita alla sera
 - B** Misurando la temperatura ascellare per due volte a distanza di un'ora
 - C** Misurando la temperatura ascellare e la temperatura orale
 - D** Calcolando la differenza di temperatura tra rilevazione rettale e ascellare
-
- 18 Secondo l'O.M.S., per "ipertensione di grado 2" si intendono valori pressori superiori a:
- A** sistolica: 140 mmHg; diastolica: 90 mmHg
 - B** sistolica: 90 mmHg; diastolica: 160 mmHg
 - C** sistolica: 160 mmHg; diastolica: 100 mmHg
 - D** sistolica: 180 mmHg; diastolica: 115 mmHg
-

Indicare quale delle seguenti affermazioni rispetto alla palpazione come tecnica di esame fisico diretto è ERRATA.

- A** Per l'esame dell'addome si utilizza esclusivamente la palpazione superficiale per non causare dolore all'assistito
 - B** Prevede l'uso delle dita e delle mani per raccogliere dati attraverso il tatto
 - C** Permette di determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza degli organi, la presenza di masse o liquidi
 - D** La palpazione superficiale viene eseguita premendo tre o quattro dita della mano dominante su un'area della cute dell'assistito per circa 1,5-3 centimetri di profondità
-

20 La cura quotidiana del meato urinario in presenza di catetere vescicale prevede l'utilizzo di:

- A** pomata antibiotica
 - B** iodopovidone al 10%
 - C** clorexidina al 2%
 - D** acqua e sapone
-

21 In base al d.lgs. 502/1992, l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture autorizzate:

- A** dallo Stato o dal Presidente del Consiglio
 - B** dalla Regione
 - C** dalla conferenza Stato-Regioni-Province
 - D** dal Ministero dell'Interno
-

22 In ambito sanitario, la rivelazione e l'utilizzo dei segreti d'ufficio sono perseguibili:

- A** sempre ma solo a querela di parte
 - B** solo dall'autorità sanitaria
 - C** sempre
 - D** a querela di parte se sono dolose
-

23 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da rosolia, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso e filtrante facciale a protezione 10 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, occhiali e camice monouso nei contatti con il malato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare una mascherina protettiva prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - D** Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi perché non vi è rischio di trasmissione interumana
-

24 Secondo il Codice deontologico, l'infermiere agisce in base:

- A** alle direttive impartite dalla struttura sanitaria
- B** al proprio livello di competenza
- C** alla propria disponibilità
- D** alle direttive impartite dal personale medico

- 25 Al fine di ridurre il dolore durante l'iniezione intramuscolare, a quale velocità si dovrà somministrare il farmaco?
- A** 1 ml di farmaco ogni secondo
 - B** 3 ml di farmaco ogni 3 secondi
 - C** 1 ml di farmaco ogni 10 secondi
 - D** 5 ml di farmaco ogni 2 secondi
-
- 26 Quale tra i seguenti è un vettore della Rickettsiosi?
- A** Yersinia
 - B** Gatto
 - C** Filattera
 - D** Zecca
-
- 27 A quale tipologia di catetere appartiene il Port-a-Cath?
- A** Totalmente impiantabile
 - B** Tunnellizzato
 - C** A medio termine
 - D** A breve termine
-
- 28 L'igiene del cavo orale, l'aspirazione delle secrezioni e il posizionamento dell'assistito con il tronco sollevato di 30-45° sono interventi infermieristici atti a prevenire:
- A** l'insorgenza di lesioni a carico del cavo orale
 - B** la polmonite associata a intubazione endotracheale
 - C** la rimozione accidentale del catetere di Swan-Ganz
 - D** la dislocazione del tubo endotracheale
-
- 29 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti nel caso in cui si sospetti l'aspirazione nelle vie aeree?
- A** Sospendere l'alimentazione, porre l'assistito in posizione semi-seduta, valutare il corretto posizionamento del sondino e avvisare il medico
 - B** Sospendere l'alimentazione, eseguire l'aspirazione delle vie aeree superiori, porre l'assistito in decubito laterale, abbassare la testiera del letto e avvisare il medico
 - C** Diminuire la velocità di infusione dell'alimentazione, auscultare i suoni polmonari, verificare l'assenza di tosse ed eventualmente aumentare gradualmente la velocità di somministrazione dell'alimentazione dopo aver avvisato il medico
 - D** Avvisare il medico, verificare i parametri respiratori, far mantenere all'assistito la posizione semi-seduta e, se non ci sono complicanze, continuare la somministrazione della dieta
-
- 30 I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
- A** devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
 - B** non possono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
 - C** devono essere smaltiti mediante compostaggio
 - D** possono essere smaltiti mediante termodistruzione e compostaggio

ESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, come viene assicurata la tutela della salute?

- A** Tramite il Servizio Sanitario Statale
 - B** Tramite i Servizi sanitari del Ministero della Salute
 - C** Tramite gli ospedali pubblici e privati presenti sul territorio
 - D** Tramite il Servizio Sanitario Nazionale e regionale
-

32 L'apnea è:

- A** la sospensione volontaria o involontaria dell'attività respiratoria
- B** l'aumento della frequenza del respiro determinato da sforzi prolungati o da alta quota
- C** l'aumento della frequenza del respiro determinato da gravi episodi febbrili
- D** il rallentamento della frequenza del respiro conseguente all'uso di farmaci ad azione sedativa

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda
Ospedaliero Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 02

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 Un paziente degente in terapia intensiva per complicanze post-operatorie ha in corso la nutrizione enterale attraverso sondino naso-gastrico. La miscela prescritta prevede l'integrazione di elementi nutrizionali quali arginina, glutammina, acidi grassi omega 3. Questa integrazione ha lo scopo di:
- A** migliorare la tollerabilità
 - B** migliorare la risposta immunitaria
 - C** migliorare la motilità
 - D** prevenire la comparsa di diarrea
-
- 2 La glicemia a digiuno nel soggetto sano ha valori:
- A** inferiori a 40 mg/dl
 - B** compresi tra 80 e 150 mg/dl
 - C** compresi tra 60 e 110 mg/dl
 - D** superiori a 150 mg/dl
-
- 3 Rispetto all'esame fisico diretto del torace, indicare quale tra le seguenti affermazioni è ERRATA.
- A** L'auscultazione permette di percepire suoni respiratori fisiologici bronchiali, broncovescicolari e vescicolari e suoni respiratori avventizi anomali
 - B** L'ispezione permette di rilevare dati relativi alla configurazione del torace, alle caratteristiche del respiro e ai segni di difficoltà respiratoria
 - C** La palpazione permette di verificare la simmetria dell'espansione della parete toracica e la presenza simmetrica del fremito vocale tattile
 - D** La percussione di un polmone fisiologico permette di percepire un suono ottuso, sordo e con ridotta risonanza
-
- 4 Quale delle seguenti affermazioni riguardo all'uso dei guanti come mezzo di barriera è corretta?
- A** I guanti non sterili vanno indossati prima di reincappucciare gli aghi usati
 - B** I guanti riducono l'incidenza della contaminazione delle mani ma non prevengono le lesioni dovute ad aghi
 - C** I guanti sterili vanno indossati prima di venire in contatto con secreti ed escreti corporei
 - D** I guanti sterili vanno indossati prima di indossare il camice sterile
-
- 5 La trasmissione dell'epatite C (HCV):
- A** non è dimostrata scientificamente
 - B** avviene per via respiratoria
 - C** avviene per via ematica
 - D** avviene tramite gli alimenti
-
- 6 I principali interventi volti a prevenire le lesioni da pressione nei soggetti a rischio sono:
- A** riposo a letto e dieta dimagrante
 - B** riposo a letto e nutrizione adeguata
 - C** mobilitazione dell'assistito, nutrizione adeguata e protezione della cute
 - D** nutrizione adeguata e sfregamento quotidiano della cute delle zone a rischio
-

- / Nell'adulto, i tempi di digiuno preoperatorio per l'assunzione di liquidi chiari o trasparenti, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:
- A** 16 ore
 - B** 2 ore
 - C** 18 ore
 - D** 15 minuti
-
- 8 In quale posizione deve essere collocato il paziente incosciente che respira?
- A** Prona
 - B** Semiseduta
 - C** Supina
 - D** Laterale di sicurezza
-
- 9 Quali onde presenta, in situazioni normali, un elettrocardiogramma?
- A** L'onda P, il complesso QRS, l'onda T, l'onda QRS, l'onda QRS-T
 - B** L'onda P, l'onda T, l'onda QRS
 - C** Nessuna delle altre alternative è corretta
 - D** L'onda P, il complesso QRS, l'onda T
-
- 10 Quando il bilancio idrico è positivo si presentano tutte le seguenti condizioni ECCETTO una. Quale?
- A** Un aumento della pressione arteriosa per un sovraccarico circolatorio
 - B** La persona assistita presenta una sensazione di sete intensa
 - C** L'introduzione di liquidi è maggiore della loro eliminazione
 - D** La formazione di edema
-
- 11 La temperatura corporea misurata per via rettale:
- A** necessita di un tempo di misurazione di 5 minuti
 - B** risulta minore di 0,3 °C rispetto a quella orale
 - C** risulta maggiore di 0,5 °C rispetto a quella ascellare
 - D** risulta maggiore di 3 °C rispetto a quella ascellare
-
- 12 Un disinfettante si definisce batteriostatico quando:
- A** uccide i batteri inattivandoli
 - B** non è in grado di agire sui virus
 - C** elimina la carica batterica
 - D** inibisce la proliferazione batterica inattivando i microrganismi
-
- 13 Quale tra le seguenti è un'indicazione da dare a un assistito sottoposto a chemioterapia per eseguire l'igiene del cavo orale?
- A** Usare dei rilevatori di placca per rimuoverla completamente
 - B** Utilizzare spazzolini a setole dure
 - C** Usare garze morbide e filo interdentale ogni sera
 - D** Fare sciacqui con fisiologica e/o bicarbonato

14 Il Codice deontologico del 2019, nel Capo II, afferma che è responsabilità dell'infermiere:

- A** interagire con i colleghi
 - B** rispettare le direttive impartite dalla struttura sanitaria secondo i protocolli
 - C** chiedere supervisione per attività nuove o con limitata casistica
 - D** rispettare gli ordini impartiti dal personale medico
-

15 Come si definisce la violazione commessa dall'operatore sanitario che altera una cartella clinica?

- A** Falso di referto medico
 - B** Falso materiale
 - C** Falso d'ufficio interno
 - D** Falso formale
-

16 Indicare, tra le seguenti affermazioni, quella corretta in caso di dolore cronico.

- A** I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) possono essere tranquillamente assunti da persone con alterata funzionalità renale
 - B** I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) somministrati in modo continuo non danneggiano la mucosa gastrica
 - C** I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) non possono essere somministrati a persone che assumono oppioidi
 - D** I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) devono essere somministrati in regime terapeutico che preveda dosi fisse e orari fissi
-

17 Quando il cittadino può accedere agli ambulatori e alle strutture private accreditate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio?

- A** Quando l'ASL non è in grado di soddisfare immediatamente la richiesta
 - B** Quando le strutture pubbliche non sono in grado di soddisfare la richiesta entro il termine stabilito dalla legge, previa autorizzazione del Comune
 - C** Il cittadino può accedervi liberamente e a sua scelta
 - D** Solo al mattino dalle ore 8:00 alle ore 10:00
-

18 Riferendosi alle attività svolte in collaborazione con il medico e riguardanti l'iter diagnostico e terapeutico, il d.m. 739/1994 stabilisce che l'infermiere:

- A** esegue le prescrizioni diagnostiche stabilite dal medico
 - B** garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche
 - C** prepara il paziente alle procedure terapeutiche
 - D** per le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, si avvale delle figure di supporto
-

19 Quale tra i seguenti è un effetto terapeutico dell'applicazione locale del freddo?

- A** Controlla il sanguinamento e il rilassamento muscolare
 - B** Diminuisce l'infiammazione accelerando i processi infiammatori e immunologici
 - C** Aumenta l'edema agendo sulla permeabilità capillare e venosa
 - D** Allevia il dolore diminuendo la velocità di conduzione nervosa
-

-
- 20 Una donna che **NON** ha mai partorito è definita:
- A** primigravida
 - B** nulligravida
 - C** primipara attempata
 - D** nullipara
-
- 21 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da varicella, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?
- A** Dovranno in ogni caso adottare solo le precauzioni standard e indossare guanti e camice nei contatti col malato
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato e, se non immuni, un filtrante facciale a protezione 2 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti, camice e occhiali nei contatti col malato e, se non immuni, una mascherina protettiva e copriscarpe
 - D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
-
- 22 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire il rischio di aspirazione?
- A** Controllare il corretto posizionamento della sonda prima della somministrazione, far mantenere la posizione di Fowler durante l'infusione dell'alimentazione e per almeno 30 minuti dopo la somministrazione
 - B** Controllare il corretto posizionamento della sonda prima, durante e dopo la somministrazione, far mantenere la posizione di Fowler durante l'infusione dell'alimentazione e la posizione supina per 10 minuti dopo la somministrazione
 - C** Controllare il corretto posizionamento della sonda dopo la somministrazione, far mantenere la posizione di Fowler durante l'infusione dell'alimentazione e per due ore dopo la somministrazione
 - D** Controllare il corretto posizionamento della sonda prima della somministrazione, far mantenere la posizione di Fowler durante l'infusione dell'alimentazione e la posizione supina per 20 minuti dopo la somministrazione
-
- 23 Il PICC, catetere centrale a inserzione periferica:
- A** non consente l'infusione di soluzioni ipertoniche (osmolarità superiore a 800 mOsm/litro)
 - B** può rimanere in sede al massimo 30 giorni
 - C** consente tutti gli utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali
 - D** non consente la rilevazione della pressione venosa centrale (PVC)
-
- 24 Individuare, tra i seguenti, un possibile effetto indesiderato della somministrazione di clistere evacuativo.
- A** Iperglicemia transitoria
 - B** Crisi vagale
 - C** Cefalea
 - D** Bradipnea e sonnolenza
-
- 25 Indicare quale fra le seguenti manifestazioni cliniche **NON** è da considerarsi una complicanza cronica del diabete mellito.
- A** Vasculopatia
 - B** Neuropatia
 - C** Pancreatite
 - D** Nefropatia
-

26 Quale fra le seguenti NON è sede di iniezione intramuscolare?

- A** Periglutea
- B** Deltoide
- C** Ventroglutea
- D** Rettofemorale

27 Nei pazienti in degenza protratta, la scala di Braden:

- A** dovrebbe essere rivalutata soltanto una volta al mese
- B** dovrebbe essere rivalutata almeno una volta ogni due settimane
- C** dovrebbe essere rivalutata ogni sette giorni, ogniqualvolta le condizioni del paziente si modificano e alla dimissione
- D** non dovrebbe essere rivalutata

28 L'irrigazione di una ferita si effettua utilizzando:

- A** siringa da 35 ml e ago da 19 G
- B** siringa da 15 ml e ago da 19 G
- C** siringa da 5 ml e ago da 23 G
- D** siringa da 35 ml e ago da 23 G

29 Tutte le seguenti sono complicanze post-operatorie precoci, TRANNE:

- A** la trombosi
- B** le infezioni
- C** l'embolia
- D** l'ipopotassiemia

30 Al momento della procedura assistenziale di posizionamento del catetere vescicale, la posizione da far assumere a un paziente di sesso femminile è:

- A** decubito dorsale con gambe flesse
- B** decubito laterale con gambe flesse
- C** decubito laterale con una gamba flessa sul lettino e l'altra gamba ipertesa
- D** decubito dorsale con gambe iperestese

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 Secondo la Costituzione italiana, la salute:

- A** è un bene fondamentale del singolo individuo
- B** è la semplice assenza di malattia
- C** non può essere annoverata tra i diritti dell'individuo
- D** è un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività

32

Il termine "dispnea" significa:

- A** frequenza respiratoria aumentata
- B** difficoltà respiratoria: il paziente può riferire fame d'aria o fiato corto
- C** frequenza respiratoria diminuita
- D** assenza di respiro dovuta a un atto volontario

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda
Ospedaliero Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 03

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da varicella, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?**
- A** Dovranno in ogni caso adottare solo le precauzioni standard e indossare guanti e camice nei contatti col malato
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato e, se non immuni, un filtrante facciale a protezione 2 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti, camice e occhiali nei contatti col malato e, se non immuni, una mascherina protettiva e copriscarpe
 - D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
-
- 2 Quale tra i seguenti è un effetto terapeutico dell'applicazione locale del freddo?**
- A** Controlla il sanguinamento e il rilassamento muscolare
 - B** Diminuisce l'infiammazione accelerando i processi infiammatori e immunologici
 - C** Aumenta l'edema agendo sulla permeabilità capillare e venosa
 - D** Allevia il dolore diminuendo la velocità di conduzione nervosa
-
- 3 In quale posizione deve essere collocato il paziente incosciente che respira?**
- A** Prona
 - B** Semiseduta
 - C** Supina
 - D** Laterale di sicurezza
-
- 4 Al momento della procedura assistenziale di posizionamento del catetere vescicale, la posizione da far assumere a un paziente di sesso femminile è:**
- A** decubito dorsale con gambe flesse
 - B** decubito laterale con gambe flesse
 - C** decubito laterale con una gamba flessa sul lettino e l'altra gamba ipertesa
 - D** decubito dorsale con gambe iperestese
-
- 5 Nei pazienti in degenza protratta, la scala di Braden:**
- A** dovrebbe essere rivalutata ogni sette giorni, ogniqualvolta le condizioni del paziente si modificano e alla dimissione
 - B** dovrebbe essere rivalutata almeno una volta ogni due settimane
 - C** dovrebbe essere rivalutata soltanto una volta al mese
 - D** non dovrebbe essere rivalutata
-
- 6 Quando il bilancio idrico è positivo si presentano tutte le seguenti condizioni ECCETTO una. Quale?**
- A** Un aumento della pressione arteriosa per un sovraccarico circolatorio
 - B** La persona assistita presenta una sensazione di sete intensa
 - C** L'introduzione di liquidi è maggiore della loro eliminazione
 - D** La formazione di edema
-

Una donna che **NON** ha mai partorito è definita:

- A** nullipara
 - B** nulligravida
 - C** primipara attempata
 - D** primigravida
-

8 Quale fra questi farmaci **NON** è un FANS?

- A** Paracetamolo
 - B** Ibuprofene
 - C** Indometacina
 - D** Acido acetilsalicilico
-

9 L'elettroencefalogramma serve a:

- A** misurare l'attività elettrica cerebrale
 - B** indagare la morfologia degli emisferi cerebrali
 - C** avere informazioni sull'attività metabolica dei neuroni
 - D** valutare il flusso ematico cerebrale
-

10 Quale delle seguenti affermazioni riguardo all'uso dei guanti come mezzo di barriera è corretta?

- A** I guanti sterili vanno indossati prima di venire in contatto con secreti ed escreti corporei
 - B** I guanti non sterili vanno indossati prima di reincappucciare gli aghi usati
 - C** I guanti riducono l'incidenza della contaminazione delle mani ma non prevengono le lesioni dovute ad aghi
 - D** I guanti sterili vanno indossati prima di indossare il camice sterile
-

11 L'igiene del cavo orale, l'aspirazione delle secrezioni e il posizionamento dell'assistito con il tronco sollevato di 30-45° sono interventi infermieristici atti a prevenire:

- A** l'insorgenza di lesioni a carico del cavo orale
 - B** la polmonite associata a intubazione endotracheale
 - C** la rimozione accidentale del catetere di Swan-Ganz
 - D** la dislocazione del tubo endotracheale
-

12 I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- A** non possono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
 - B** devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
 - C** devono essere smaltiti mediante compostaggio
 - D** possono essere smaltiti mediante termodistruzione e compostaggio
-

13 Secondo l'O.M.S., per "ipertensione di grado 2" si intendono valori pressori superiori a:

- A** sistolica: 90 mmHg; diastolica: 160 mmHg
 - B** sistolica: 160 mmHg; diastolica: 100 mmHg
 - C** sistolica: 140 mmHg; diastolica: 90 mmHg
 - D** sistolica: 180 mmHg; diastolica: 115 mmHg
-

14 Quale fra le seguenti NON è sede di iniezione intramuscolare?

- A** Deltoidale
- B** Periglutea
- C** Ventroglutea
- D** Rettofemorale

15 In un paziente in posizione supina, le zone maggiormente a rischio di lesioni da pressione sono:

- A** occipite, regione sacrale, scapole, gomiti e talloni
- B** fronte, mento, torace, ginocchia e metacarpi
- C** malleoli interni, orecchie e naso
- D** ginocchio, trocantere e orecchio, nel lato di appoggio

16 Rispetto all'esame fisico diretto del torace, indicare quale tra le seguenti affermazioni è ERRATA.

- A** La palpazione permette di verificare la simmetria dell'espansione della parete toracica e la presenza simmetrica del fremito vocale tattile
- B** L'ispezione permette di rilevare dati relativi alla configurazione del torace, alle caratteristiche del respiro e ai segni di difficoltà respiratoria
- C** La percussione di un polmone fisiologico permette di percepire un suono ottuso, sordo e con ridotta risonanza
- D** L'auscultazione permette di percepire suoni respiratori fisiologici bronchiali, broncovescicolari e vescicolari e suoni respiratori avventizi anomali

17 È stato appena posizionato un sondino naso-gastrico per nutrizione enterale a un giovane in stato di incoscienza a seguito di un trauma cranico. Dopo la verifica tramite radiografia del corretto posizionamento della sonda, come l'infermiere dovrebbe gestire l'avvio dell'alimentazione?

- A** Inizia la miscela nutritiva a un flusso di 50 ml/h in infusione continua, controlla ogni 3 ore la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di rigurgito e diarrea
- B** Inizia dopo 48 ore la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla al termine di ogni miscela la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di vomito e diarrea
- C** Inizia dopo circa 48 ore la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla la pervietà del sondino e verifica la comparsa di febbre e dispnea
- D** Inizia la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla dopo 4-5 ore la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di tosse e dispnea

18 A quale tipologia di catetere appartiene il Port-a-Cath?

- A** Tunnellizzato
- B** Totalmente impiantabile
- C** A medio termine
- D** A breve termine

19 Indicare quale fra le seguenti manifestazioni cliniche NON è da considerarsi una complicanza cronica del diabete mellito.

- A** Pancreatite
- B** Neuropatia
- C** Vasculopatia
- D** Nefropatia

Quando il cittadino può accedere agli ambulatori e alle strutture private accreditate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio?

- A** Quando le strutture pubbliche non sono in grado di soddisfare la richiesta entro il termine stabilito dalla legge, previa autorizzazione del Comune
 - B** Il cittadino può accedervi liberamente e a sua scelta
 - C** Quando l'ASL non è in grado di soddisfare immediatamente la richiesta
 - D** Solo al mattino dalle ore 8:00 alle ore 10:00
-

21 Tutte le seguenti sono complicanze post-operatorie precoci, TRANNE:

- A** l'ipopotassiemia
 - B** la trombosi
 - C** l'embolia
 - D** le infezioni
-

22 Secondo la normativa inerente al Profilo professionale (d.m. Sanità 739/1994), con responsabilità dell'infermiere, ci si riferisce:

- A** alla sola responsabilità penale che deriva dall'esercizio della professione
 - B** alla sola obbligatorietà alla formazione continua
 - C** all'assistenza generale infermieristica
 - D** a nessuna delle altre alternative
-

23 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti nel caso in cui si sospetti l'aspirazione nelle vie aeree?

- A** Sospendere l'alimentazione, porre l'assistito in posizione semi-seduta, valutare il corretto posizionamento del sondino e avvisare il medico
 - B** Sospendere l'alimentazione, eseguire l'aspirazione delle vie aeree superiori, porre l'assistito in decubito laterale, abbassare la testiera del letto e avvisare il medico
 - C** Diminuire la velocità di infusione dell'alimentazione, auscultare i suoni polmonari, verificare l'assenza di tosse ed eventualmente aumentare gradualmente la velocità di somministrazione dell'alimentazione dopo aver avvisato il medico
 - D** Avvisare il medico, verificare i parametri respiratori, far mantenere all'assistito la posizione semi-seduta e, se non ci sono complicanze, continuare la somministrazione della dieta
-

24 Come si definisce la violazione commessa dall'operatore sanitario che altera una cartella clinica?

- A** Falso materiale
 - B** Falso di referto medico
 - C** Falso d'ufficio interno
 - D** Falso formale
-

25 La prevenzione delle complicanze tromboemboliche nella persona operata si basa su tutte le seguenti prestazioni TRANNE una: quale?

- A** Mantenere la persona a letto
 - B** Far svolgere esercizi attivi o passivi degli arti inferiori durante la permanenza a letto
 - C** Applicare calze elastiche durante la permanenza a letto
 - D** Idratare il paziente
-

26 L'irrigazione di una ferita si effettua utilizzando:

- A** siringa da 5 ml e ago da 23 G
 - B** siringa da 15 ml e ago da 19 G
 - C** siringa da 35 ml e ago da 19 G
 - D** siringa da 35 ml e ago da 23 G
-

27 Se il colore delle urine ha l'aspetto definito "lavatura di carne", si è in presenza di:

- A** nicturia
 - B** ematuria
 - C** piuria
 - D** stranguria
-

28 Come si rileva la temperatura differenziale in un paziente?

- A** Misurando la temperatura ascellare per due volte a distanza di un'ora
 - B** Calcolando la differenza di temperatura tra rilevazione rettale e ascellare
 - C** Misurando la temperatura ascellare e la temperatura orale
 - D** Calcolando la differenza di temperatura tra rilevazione rettale eseguita al mattino e rilevazione ascellare eseguita alla sera
-

29 Secondo il Codice deontologico, l'infermiere agisce in base:

- A** alle direttive impartite dal personale medico
 - B** alle direttive impartite dalla struttura sanitaria
 - C** alla propria disponibilità
 - D** al proprio livello di competenza
-

30 La trasmissione dell'epatite C (HCV):

- A** avviene per via respiratoria
 - B** avviene per via ematica
 - C** non è dimostrata scientificamente
 - D** avviene tramite gli alimenti
-

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 Secondo la Costituzione italiana, la salute:

- A** è la semplice assenza di malattia
 - B** è un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività
 - C** non può essere annoverata tra i diritti dell'individuo
 - D** è un bene fondamentale del singolo individuo
-

,2

Il termine "dispnea" significa:

- A** frequenza respiratoria aumentata
- B** difficoltà respiratoria: il paziente può riferire fame d'aria o fiato corto
- C** frequenza respiratoria diminuita
- D** assenza di respiro dovuta a un atto volontario

habe

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda
Ospedaliero Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 04

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 **Quale delle seguenti affermazioni riferite al lavaggio sociale delle mani NON è corretta?**
- A** È necessario usare lo spazzolino per le unghie
 - B** È necessario togliere tutti i monili
 - C** Bisogna asciugare le mani con salviette monouso
 - D** La procedura deve durare 40-60 secondi
-
- 2 **In quale dei seguenti casi è opportuno considerare l'utilizzo di alternative al cateterismo vescicale in favore di dispositivi meno invasivi?**
- A** Paziente di sesso maschile, collaborante, senza problemi di ritenzione urinaria o di ostruzione vescicale
 - B** Paziente di sesso maschile, collaborante, con problemi di ritenzione urinaria e ostruzione vescicale
 - C** Paziente di sesso femminile, non collaborante, in stato di shock ipovolemico
 - D** Paziente di sesso femminile, collaborante, con gonfiore al di sopra della sinfisi pubica, sottoposta poche ore prima ad anestesia spinale
-
- 3 **Il trattamento della chetoacidosi diabetica prevede, oltre alla somministrazione d'insulina:**
- A** la somministrazione di diuretici dell'ansa
 - B** la somministrazione di glucagone per via intramuscolare
 - C** l'infusione di soluzioni aminoacide tamponate con insulina
 - D** l'infusione, per via endovenosa, di soluzione fisiologica e reidratante
-
- 4 **Quali sono le principali funzioni dell'assistenza infermieristica, secondo quanto stabilito dal d.m. 739/1994 (Profilo professionale dell'infermiere)?**
- A** Identificazione dei bisogni clinici, pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici
 - B** Sostenere, assistere e informare la persona e la collettività
 - C** Prevenzione delle malattie, assistenza dei malati e dei disabili, educazione sanitaria
 - D** Collaborazione con gli altri operatori sanitari nel rispetto delle loro specifiche competenze
-
- 5 **A quale livello deve essere mantenuta la sacca di raccolta delle urine collegata al catetere vescicale?**
- A** Al livello della vescica
 - B** Al di sotto del livello della vescica
 - C** Al di sopra del livello della vescica
 - D** Non è importante considerare il livello rispetto alla vescica
-
- 6 **Quale tra i seguenti presidi è utile nella profilassi trombo-embolica post-chirurgica?**
- A** Antibiotici ad ampio spettro
 - B** Statine
 - C** Acido folico
 - D** Eparina a basso peso molecolare
-

La scala di Aldrete viene utilizzata per la valutazione della giusta dimissione dalla sala risveglio di un paziente operato. Quali sono i criteri che l'infermiere valuta con l'ausilio di tale scala?

- A** Dolore, vomito post-operatorio, stabilità respiratoria, stabilità emodinamica
- B** Livello di coscienza, attività fisica, stabilità emodinamica, stabilità respiratoria, saturazione d'ossigeno, presenza di nausea e vomito
- C** Attività muscolare, respirazione, circolazione, livello di coscienza, saturazione d'ossigeno
- D** Coscienza, respirazione, vomito post-operatorio, ipotermia

8 La trasmissione del vibrione del colera avviene principalmente:

- A** per via oro-fecale
- B** tramite contatto da persona a persona
- C** tramite goccioline di Flügge
- D** per via respiratoria

9 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale somministrata da sondino nasogastrico, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta corretto?

- A** Somministrare la dieta immediatamente dopo averla prelevata dal frigorifero, per prevenirne la degradazione
- B** Dopo aver eseguito la valutazione del ristagno gastrico, eliminare il materiale prelevato per evitare che l'accumulo eccessivo di liquido all'interno dello stomaco provochi vomito durante la somministrazione della dieta
- C** Dopo la valutazione del ristagno gastrico, re-infondere dal sondino tutto il materiale prelevato per evitare lo squilibrio idroelettrolitico
- D** Somministrare l'alimentazione e, se di durata superiore alle 72 ore, evitare di interromperla per sostituire flaconi e circuito, per evitarne la contaminazione

10 Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, la percussione:

- A** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
- B** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area, al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
- C** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
- D** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio

11 Secondo il Codice deontologico, la relazione di cura stabilita dall'infermiere nell'agire professionale viene costruita anche utilizzando quale dei seguenti elementi?

- A** Il dialogo
- B** La prudenza
- C** Il distacco professionale
- D** La competenza tecnica

12 La misurazione della temperatura dovrebbe essere effettuata:

- A** nelle stesse ore, ma non necessariamente nella stessa sede, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
- B** nelle stesse ore e nella stessa sede utilizzando lo stesso termometro, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
- C** nella stessa sede ma non necessariamente nelle stesse ore, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
- D** variando le ore e la sede, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile in base alla sede utilizzata

-
- 13 Il d.lgs. 502/1992 prevede che i cittadini:
- A** debbano utilizzare le strutture indicate dall'Azienda Sanitaria Locale al fine dell'ottimizzazione della strumentazione e delle risorse economiche disponibili
 - B** esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali
 - C** debbano utilizzare le strutture indicate dall'Azienda Sanitaria Locale al fine dell'ottimizzazione del personale e dei percorsi clinico-assistenziali
 - D** esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti sia nell'ambito dei soggetti accreditati sia con soggetti non riconosciuti
-
- 14 Quali, tra i seguenti valori di natremia, possono essere considerati normali nell'adulto?
- A** 110-123 mEq/L
 - B** 147-158 mEq/L
 - C** 136-145 mEq/L
 - D** 93-107 mEq/L
-
- 15 I tempi di digiuno preoperatorio, nel bambino e nell'adulto, per l'assunzione di latte vaccino, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:
- A** un'ora
 - B** 20 ore
 - C** 6 ore
 - D** 30 minuti
-
- 16 Quali sono le zone a rischio per lesioni da pressione quando il malato assume il decubito laterale?
- A** Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo
 - B** Orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
 - C** Malleolo interno, polpacci, sacro, spalla, orecchio, coste, guance
 - D** Orecchio, coste, processi spinosi vertebrali, malleolo
-
- 17 Quale tra i seguenti NON è un contraccettivo di barriera?
- A** Cappuccio cervicale
 - B** Profilattico
 - C** Diaframma
 - D** Contraccettivo ormonale
-
- 18 Secondo la Raccomandazione Ministeriale per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici, le verifiche da effettuare prima della somministrazione sono:
- A** solo nome del farmaco, dose e velocità di somministrazione ed eventuale premedicazione
 - B** solo corrispondenza tra farmaco prescritto e quello pervenuto, nome del farmaco, dose e via di somministrazione
 - C** corrispondenza tra farmaco prescritto e quello pervenuto, nome del farmaco, dose, via di somministrazione, velocità di somministrazione, scadenza e integrità dei contenitori ed eventuale premedicazione
 - D** solo nome del farmaco, integrità dei contenitori e via di somministrazione
-

-
- 19 La Glasgow Coma Scale (GCS) è una scala di valutazione:
- A** del grado di autonomia acquisito dal paziente con esito di trauma cranico
 - B** della coscienza dopo traumi cranici. Utilizza come test l'apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria
 - C** del tono muscolare, che viene utilizzata nei pazienti affetti da patologie neurologiche
 - D** delle funzioni cognitive nei soggetti con esiti di coma
-
- 20 Quale tra le seguenti tipologie di catetere vescicale è indicata per lo svuotamento vescicale pre-parto?
- A** Nelaton
 - B** Tiemann
 - C** Foley
 - D** Foley con sonda termica
-
- 21 Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:
- A** proteggere da infezioni
 - B** ritardare la cicatrizzazione
 - C** proteggere da parassiti
 - D** prevenire il sanguinamento
-
- 22 Quale posizione deve assumere un assistito durante la manovra di posizionamento di un drenaggio toracico?
- A** Decubito laterale sinistro
 - B** Decubito supino o semi-seduto
 - C** Decubito prono
 - D** Posizione di Trendelenburg
-
- 23 Nell'assistere un paziente nel post-operatorio, si deve ricordare che il dolore può essere influenzato:
- A** dall'ora di esecuzione dell'intervento chirurgico
 - B** dalla sede e dalla durata dell'intervento chirurgico
 - C** dal tipo di antisettico utilizzato per la preparazione cutanea
 - D** dalla durata del digiuno preoperatorio
-
- 24 La comparsa di ponfo durante l'esecuzione di iniezione intradermica indica che l'iniezione:
- A** ha provocato la rottura di un vaso sanguigno
 - B** ha provocato una reazione allergica
 - C** è stata eseguita correttamente
 - D** è stata eseguita troppo superficialmente
-
- 25 Per eseguire l'igiene del cavo orale in un paziente incosciente è opportuno metterlo in posizione:
- A** di Fowler
 - B** di Trendelenburg
 - C** seduta
 - D** laterale
-

26 Quale delle seguenti sostanze NON è un disinfettante?

- A** Clorexidina
- B** Polivinilpirrolidone-iodio
- C** Perossido di ossigeno
- D** Soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%

27 In ambito sanitario, la responsabilità penale è:

- A** solo del personale medico
- B** solo del professionista sanitario in possesso del titolo di Laurea
- C** del singolo
- D** solo di colui che riveste ruoli di responsabilità

28 Per eseguire una colon TC:

- A** si insuffla aria per via endorettale
- B** si esegue la TAC dell'addome in quattro fasi
- C** il mezzo di contrasto si somministra tramite il colonscopio
- D** si fa ingerire un cucchiaino di bario al paziente prima di posizionarlo

29 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire la disidratazione?

- A** Somministrare acqua ogni 4-6 ore e, alla fine di ogni pasto, valutare il bilancio idrico
- B** Somministrare acqua ogni 4-6 ore, sostituire la dieta con una a osmolarità maggiore e valutare il bilancio idrico
- C** Somministrare acqua ogni 2 ore e infondere la dieta a velocità rapida
- D** Somministrare acqua alla fine di ogni pasto e pesare il paziente una volta al giorno

30 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da scabbia, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti con il malato e con arredi, attrezzature e materiale potenzialmente contaminato
- B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, mascherina e occhiali nei contatti con il malato e con arredi, attrezzature e materiale potenzialmente contaminato
- C** Dovranno adottare sempre le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso solo se il soggetto presenta lesioni da grattamento
- D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 L'educazione continua in medicina è obbligatoria:

- A** per la professione sanitaria medica
- B** per tutti i professionisti
- C** per tutti i professionisti della sanità
- D** solo per i dipendenti ospedalieri

32

Il polso tibiale si localizza:

- A** nell'incavo tra il muscolo bicipite e il tricipite
- B** dietro il malleolo mediano del piede
- C** nella fossa poplitea lungo la parete esterna del tendine mediano
- D** tra la fossa coronoidea e l'epicondilo mediale