

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 05

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

-
- 1 Nell'immediato postoperatorio, quali sono gli intervalli di tempo per la rilevazione della temperatura corporea, nelle prime 24 ore?
- A** Ogni 18 ore
 - B** Ogni 4 ore
 - C** Ogni 36 ore
 - D** Una volta nella settimana
-
- 2 Nell'esecuzione di un esame dell'area rettale e perianale, l'infermiere dovrà fare assumere alla persona la posizione:
- A** di semi-Fowler
 - B** genupettorale
 - C** supina
 - D** di anti-Trendelenburg
-
- 3 Quale tra le seguenti scale di misurazione del dolore valuta le risposte comportamentali e i parametri fisiologici?
- A** NRS: Numeric Rating Scale
 - B** VRS: Scala di Valutazione Verbale
 - C** PAINAD: Pain Assessment in Advanced Dementia
 - D** Wong-Baker Faces Pain Rating Scale
-
- 4 Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:
- A** ridurre il disagio dovuto alla visione della ferita
 - B** ritardare la cicatrizzazione
 - C** proteggere da parassiti
 - D** prevenire il sanguinamento
-
- 5 Chiunque riveli l'identità di chi ha fatto ricorso agli interventi previsti dalla legge per l'interruzione volontaria della gravidanza, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, è punito con una sanzione di carattere:
- A** amministrativo
 - B** civile
 - C** penale
 - D** pecuniario
-
- 6 Un assistito con dolore assume terapia con morfina. Per valutare l'eventuale comparsa di effetti collaterali, quali dati raccoglierà l'infermiere?
- A** Frequenza e caratteristiche dell'eliminazione fecale
 - B** Quantità e caratteristiche delle urine
 - C** PT, PTT e INR
 - D** Temperatura corporea interna ed esterna

Quale, tra le seguenti sostanze, è in grado di sterilizzare strumenti termosensibili o che contengono componenti elettronici?

- A** Ossido di etilene
 - B** Clorexidina
 - C** Soluzione alcolica al 40%
 - D** Soluzione alcolica al 90%
-

8 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da tubercolosi polmonare aperta, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare solo guanti e camice nei contatti con il malato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti, camice nei contatti con il malato e, se non immuni, un filtrante facciale a protezione 2 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - D** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare un filtrante facciale a protezione 2 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
-

9 A una persona diabetica cosciente in ipoglicemia è indicato somministrare:

- A** 15 g di carboidrati semplici
 - B** circa 50 g di carboidrati complessi, come fette biscottate, pane o cracker
 - C** una fetta di torta oppure 5-6 biscotti secchi
 - D** 5 g di glucosio in compresse
-

10 Il Codice Deontologico dell'Infermiere, pubblicato nel 2019, all'art. 1 definisce l'infermiere come:

- A** l'operatore sanitario responsabile dell'assistenza sanitaria
 - B** il professionista sanitario, iscritto all'ordine delle professioni infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile
 - C** il professionista sanitario responsabile dell'assistenza socio-sanitaria
 - D** il professionista sanitario in possesso del diploma in Scienze infermieristiche
-

11 Oltre a un aumento dei valori della pressione venosa centrale, è un segno clinico d'insufficienza cardiaca destra:

- A** la poliuria e conseguente polidipsia
 - B** la comparsa di polifagia
 - C** la comparsa di edemi declivi
 - D** la bradicardia
-

12 Le infezioni genitali da HPV nella donna hanno una rilevante importanza clinica perché:

- A** sono molto comuni
 - B** possono degenerare in cancro, se sostenute soprattutto da alcuni genotipi
 - C** si associano quasi sempre a infezione batterica
 - D** sono molto dolorose
-

-
- 13 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta corretto applicare nel caso in cui sia necessario somministrare farmaci?
- A** Polverizzare le compresse a rilascio prolungato o gastroprotette e somministrarle attraverso la sonda, lavandone accuratamente il lume con 30-50 ml di acqua per evitarne l'oclusione
 - B** Polverizzare le compresse singolarmente e somministrarle una per volta, sciolte in acqua, senza mischiarle alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
 - C** Polverizzare le compresse e somministrarle in un'unica manovra, sciolte insieme in acqua, senza mischiarle alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
 - D** Polverizzare le compresse e scioglierle in acqua, somministrandole insieme alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
-
- 14 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire la diarrea?
- A** Somministrare lentamente una dieta a temperatura ambiente
 - B** Somministrare la dieta posizionando l'assistito in decubito supino
 - C** Aumentare l'apporto idrico e sostituire il preparato per nutrizione con una dieta a osmolarità maggiore
 - D** Somministrare una dieta iperosmolare a basso flusso, a basso contenuto idrico e a temperatura ambiente
-
- 15 Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, l'auscultazione:
- A** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
 - B** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
 - C** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio
 - D** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
-
- 16 Si definisce "ipossia":
- A** una condizione in cui prevale un metabolismo aerobico
 - B** una pressione di CO₂ al di sotto dei 60 mmHg
 - C** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 cmH₂O
 - D** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 mmHg
-
- 17 Al fine di prevenire lo sviluppo di lesioni da pressione nei soggetti a rischio è importante:
- A** ridurre al minimo frizione e attrito sulla superficie d'appoggio della cute
 - B** effettuare le mobilizzazioni trascinando il paziente sulle lenzuola
 - C** ridurre la frequenza dell'igiene perineale in caso di incontinenza fecale
 - D** evitare le variazioni di decubito nel letto
-
- 18 Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera?
- A** I degenti
 - B** Le mani dell'operatore
 - C** Le lenzuola e gli effetti personali del paziente
 - D** La strumentazione sanitaria
-

-
- Con riferimento ai cateteri vescicali, quale delle seguenti alternative è ERRATA?
- A** La scala di misurazione è quella di French
 - B** Maggiore è il diametro del lume, maggiore è il numero del catetere
 - C** Maggiore è il diametro del lume, minore è il numero del catetere
 - D** I numeri della scala di misurazione corrispondono al diametro del lume
-
- 20 Indicare l'alternativa che riporta tutte e solo le sedi utilizzate per l'iniezione intramuscolare.
- A** Dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto laterale
 - B** Dorsoglutea, lateroglutea, deltoidea, vasto femorale, retto femorale
 - C** Dorsoglutea, ventroglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale
 - D** Dorsoglutea, deltoidea, vasto laterale, retto femorale
-
- 21 Quale ente, secondo il d.lgs. 229/1999, provvede all'autorizzazione e all'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche o private a fornire prestazioni per conto del SSN?
- A** La Regione
 - B** L'ASL o la Provincia/Città metropolitana
 - C** Il Ministero della Salute o il Consiglio dei Ministri
 - D** Il Comune o la zona di competenza
-
- 22 Qual è l'esame strumentale che valuta i volumi polmonari?
- A** Ossimetria
 - B** Capnometria
 - C** Spirometria
 - D** Videolaringoscopia
-
- 23 Quale delle seguenti attività NON rientra tra quelle attribuite alla professione infermieristica?
- A** La prevenzione
 - B** La diagnosi
 - C** L'educazione sanitaria
 - D** L'assistenza sanitaria
-
- 24 I tempi di digiuno preoperatorio, nell'adulto, per l'assunzione di un pasto leggero, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:
- A** 2 ore
 - B** 18 ore
 - C** 24 ore
 - D** 6 ore
-
- 25 Quale tra le seguenti NON è un'indicazione al posizionamento di catetere vescicale?
- A** Quando è necessario iniettare mezzi di contrasto in vescica a scopo diagnostico
 - B** Ritenzione urinaria o assenza di riflesso neurologico vescicale
 - C** Mantenere la vescica vuota in caso di interventi chirurgici a carico delle vie urinarie
 - D** Neoplasia del bacinetto renale o dell'uretere, per il quale sia stato posizionato uno stent
-

26 La trasmissione di *Salmonella typhi* avviene:

- A** per via sessuale
- B** per via oro-fecale
- C** per via aerea
- D** per contatto parenterale

27 Qual è la via di somministrazione delle EBPM (eparine a basso peso molecolare)?

- A** Intramuscolare
- B** Orale
- C** Sottocutanea
- D** Transdermica

28 I pazienti con lesioni del cavo orale e i pazienti che non possono assumere liquidi per bocca hanno bisogno di sciacquare la bocca:

- A** con della pasta all'acqua profumata al mentolo almeno ogni due ore
- B** una o due volte al giorno e detergere la rima labiale per evitare la formazione di secrezioni
- C** solo dopo il pasto più abbondante della giornata e idratare le labbra con vaselina
- D** almeno ogni due ore e idratare le labbra con prodotti emollienti

29 Una complicanza precoce della tracheostomia è:

- A** la fistola tracheo-esofagea
- B** l'enfisema sottocutaneo
- C** l'infezione respiratoria
- D** la stenosi tracheale

30 Nel caso di un paziente portatore di catetere vescicale a permanenza, occorre che la sacca di raccolta delle urine sia:

- A** posta sopra il livello della vescica
- B** posta sotto il livello della vescica
- C** scollegata dal catetere vescicale in caso di mobilitazione del paziente
- D** collegata al catetere solo nelle ore diurne

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.


31 Il trattamento che permette di regolare la composizione del sangue di pazienti affetti da gravi malattie renali è detto:

- A** nefrite
- B** nefrectomia
- C** ematoma
- D** emodialisi

32 Le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, sono definite dai:

- A** Livelli Europei di Assistenza
- B** Livelli Sanitari Garantiti
- C** Livelli Garantiti di Assistenza
- D** Livelli Essenziali di Assistenza

doordana Libri



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda
Ospedaliero Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara**




PROVA SCRITTA – PROVA 06



NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



-
- 1 **Quale posizione deve assumere un assistito durante la manovra di posizionamento di un drenaggio toracico?**
- A** Decubito laterale sinistro
 - B** Decubito supino o semi-seduto
 - C** Decubito prono
 - D** Posizione di Trendelenburg
-
- 2 **Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:**
- A** proteggere da infezioni
 - B** ritardare la cicatrizzazione
 - C** proteggere da parassiti
 - D** prevenire il sanguinamento
-
- 3 **Una complicanza precoce della tracheostomia è:**
- A** l'enfisema sottocutaneo
 - B** la fistola tracheo-esofagea
 - C** l'infezione respiratoria
 - D** la stenosi tracheale
-
- 4 **Oltre a un aumento dei valori della pressione venosa centrale, è un segno clinico d'insufficienza cardiaca destra:**
- A** la comparsa di polifagia
 - B** la comparsa di edemi declivi
 - C** la poliuria e conseguente polidipsia
 - D** la bradicardia
-
- 5 **Quale tra le seguenti tipologie di catetere vescicale è indicata per lo svuotamento vescicale pre-parto?**
- A** Foley
 - B** Tiemann
 - C** Nelaton
 - D** Foley con sonda termica
-
- 6 **Per eseguire una colon TC:**
- A** il mezzo di contrasto si somministra tramite il colonscopio
 - B** si esegue la TAC dell'addome in quattro fasi
 - C** si insuffia aria per via endorettale
 - D** si fa ingerire un cucchiaino di bario al paziente prima di posizionarlo

Secondo la Raccomandazione Ministeriale per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici, le verifiche da effettuare prima della somministrazione sono:

- A** corrispondenza tra farmaco prescritto e quello pervenuto, nome del farmaco, dose, via di somministrazione, velocità di somministrazione, scadenza e integrità dei contenitori ed eventuale premedicazione
 - B** solo corrispondenza tra farmaco prescritto e quello pervenuto, nome del farmaco, dose e via di somministrazione
 - C** solo nome del farmaco, dose e velocità di somministrazione ed eventuale premedicazione
 - D** solo nome del farmaco, integrità dei contenitori e via di somministrazione
-

8 Si definisce "ipossia":

- A** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 cmH₂O
 - B** una pressione di CO₂ al di sotto dei 60 mmHg
 - C** una pressione di O₂ al di sotto dei 60 mmHg
 - D** una condizione in cui prevale un metabolismo aerobico
-

9 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire la diarrea?

- A** Somministrare una dieta iperosmolare a basso flusso, a basso contenuto idrico e a temperatura ambiente
 - B** Somministrare la dieta posizionando l'assistito in decubito supino
 - C** Aumentare l'apporto idrico e sostituire il preparato per nutrizione con una dieta a osmolarità maggiore
 - D** Somministrare lentamente una dieta a temperatura ambiente
-

10 Nell'assistere un paziente nel post-operatorio, si deve ricordare che il dolore può essere influenzato:

- A** dal tipo di antisettico utilizzato per la preparazione cutanea
 - B** dall'ora di esecuzione dell'intervento chirurgico
 - C** dalla sede e dalla durata dell'intervento chirurgico
 - D** dalla durata del digiuno preoperatorio
-

11 Quale, tra le seguenti sostanze, è in grado di sterilizzare strumenti termosensibili o che contengono componenti elettronici?

- A** Clorexidina
 - B** Ossido di etilene
 - C** Soluzione alcolica al 40%
 - D** Soluzione alcolica al 90%
-

12 I tempi di digiuno preoperatorio, nel bambino e nell'adulto, per l'assunzione di latte vaccino, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:

- A** 20 ore
- B** 6 ore
- C** un'ora
- D** 30 minuti

-
- 13 **Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, l'auscultazione:**
- A** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
 - B** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
 - C** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
 - D** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio
-

- 14 **Quali sono le zone a rischio per lesioni da pressione quando il malato assume il decubito laterale?**
- A** Orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
 - B** Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo
 - C** Malleolo interno, polpacci, sacro, spalla, orecchio, coste, guance
 - D** Orecchio, coste, processi spinosi vertebrali, malleolo
-

- 15 **A una persona diabetica cosciente in ipoglicemia è indicato somministrare:**
- A** circa 50 g di carboidrati complessi, come fette biscottate, pane o cracker
 - B** 15 g di carboidrati semplici
 - C** una fetta di torta oppure 5-6 biscotti secchi
 - D** 5 g di glucosio in compresse
-

- 16 **I pazienti con lesioni del cavo orale e i pazienti che non possono assumere liquidi per bocca hanno bisogno di sciacquare la bocca:**
- A** una o due volte al giorno e detergere la rima labiale per evitare la formazione di secrezioni
 - B** almeno ogni due ore e idratare le labbra con prodotti emollienti
 - C** solo dopo il pasto più abbondante della giornata e idratare le labbra con vaselina
 - D** con della pasta all'acqua profumata al mentolo almeno ogni due ore
-

- 17 **Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta corretto applicare nel caso in cui sia necessario somministrare farmaci?**
- A** Polverizzare le compresse e scioglierle in acqua, somministrandole insieme alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
 - B** Polverizzare le compresse a rilascio prolungato o gastroprotette e somministrarle attraverso la sonda, lavandone accuratamente il lume con 30-50 ml di acqua per evitarne l'occlusione
 - C** Polverizzare le compresse e somministrarle in un'unica manovra, sciolte insieme in acqua, senza mischiarle alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
 - D** Polverizzare le compresse singolarmente e somministrarle una per volta, sciolte in acqua, senza mischiarle alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
-

- 18 **Il Codice Deontologico dell'Infermiere, pubblicato nel 2019, all'art. 1 definisce l'infermiere come:**
- A** il professionista sanitario responsabile dell'assistenza socio-sanitaria
 - B** l'operatore sanitario responsabile dell'assistenza sanitaria
 - C** il professionista sanitario, iscritto all'ordine delle professioni infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile
 - D** il professionista sanitario in possesso del diploma in Scienze infermieristiche
-

-
- 19 **Quale tra le seguenti NON è un'indicazione al posizionamento di catetere vescicale?**
- A** Ritenzione urinaria o assenza di riflesso neurologico vescicale
 - B** Neoplasia del bacinetto renale o dell'uretere, per il quale sia stato posizionato uno stent
 - C** Mantenere la vescica vuota in caso di interventi chirurgici a carico delle vie urinarie
 - D** Quando è necessario iniettare mezzi di contrasto in vescica a scopo diagnostico
-
- 20 **La comparsa di ponfo durante l'esecuzione di iniezione intradermica indica che l'iniezione:**
- A** è stata eseguita troppo superficialmente
 - B** ha provocato una reazione allergica
 - C** ha provocato la rottura di un vaso sanguigno
 - D** è stata eseguita correttamente
-
- 21 **Le infezioni genitali da HPV nella donna hanno una rilevante importanza clinica perché:**
- A** sono molto comuni
 - B** possono degenerare in cancro, se sostenute soprattutto da alcuni genotipi
 - C** si associano quasi sempre a infezione batterica
 - D** sono molto dolorose
-
- 22 **Quale delle seguenti attività NON rientra tra quelle attribuite alla professione infermieristica?**
- A** L'educazione sanitaria
 - B** La prevenzione
 - C** La diagnosi
 - D** L'assistenza sanitaria
-
- 23 **In ambito sanitario, la responsabilità penale è:**
- A** solo del personale medico
 - B** solo del professionista sanitario in possesso del titolo di Laurea
 - C** del singolo
 - D** solo di colui che riveste ruoli di responsabilità
-
- 24 **La misurazione della temperatura dovrebbe essere effettuata:**
- A** nelle stesse ore e nella stessa sede utilizzando lo stesso termometro, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
 - B** nelle stesse ore, ma non necessariamente nella stessa sede, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
 - C** nella stessa sede ma non necessariamente nelle stesse ore, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
 - D** variando le ore e la sede, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile in base alla sede utilizzata
-

25 La trasmissione di *Salmonella typhi* avviene:

- A** per via oro-fecale
 - B** per via sessuale
 - C** per via aerea
 - D** per contatto parenterale
-

26 Il d.lgs. 502/1992 prevede che i cittadini:

- A** debbano utilizzare le strutture indicate dall'Azienda Sanitaria Locale al fine dell'ottimizzazione della strumentazione e delle risorse economiche disponibili
 - B** esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali
 - C** debbano utilizzare le strutture indicate dall'Azienda Sanitaria Locale al fine dell'ottimizzazione del personale e dei percorsi clinico-assistenziali
 - D** esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti sia nell'ambito dei soggetti accreditati sia con soggetti non riconosciuti
-

27 Quale tra le seguenti scale di misurazione del dolore valuta le risposte comportamentali e i parametri fisiologici?

- A** PAINAD: Pain Assessment in Advanced Dementia
 - B** VRS: Scala di Valutazione Verbale
 - C** NRS: Numeric Rating Scale
 - D** Wong-Baker Faces Pain Rating Scale
-

28 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da scabbia, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Dovranno adottare sempre le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso solo se il soggetto presenta lesioni da grattamento
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, mascherina e occhiali nei contatti con il malato e con arredi, attrezzature e materiale potenzialmente contaminato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti con il malato e con arredi, attrezzature e materiale potenzialmente contaminato
 - D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
-

29 Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera?

- A** Le mani dell'operatore
 - B** I degenti
 - C** Le lenzuola e gli effetti personali del paziente
 - D** La strumentazione sanitaria
-

30 A quale livello deve essere mantenuta la sacca di raccolta delle urine collegata al catetere vescicale?

- A** Al livello della vescica
 - B** Al di sotto del livello della vescica
 - C** Al di sopra del livello della vescica
 - D** Non è importante considerare il livello rispetto alla vescica
-

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 Il trattamento che permette di regolare la composizione del sangue di pazienti affetti da gravi malattie renali è detto:

- A** nefrite
 - B** nefrectomia
 - C** ematoma
 - D** emodialisi
-

32 L'educazione continua in medicina è obbligatoria:

- A** solo per i dipendenti ospedalieri
- B** per tutti i professionisti
- C** per la professione sanitaria medica
- D** per tutti i professionisti della sanità



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 07

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

1 Il lavaggio delle mani mira specificamente a prevenire:

- A** le infezioni respiratorie
 - B** la trasmissione di tutti gli agenti virali
 - C** la trasmissione delle malattie infettive ematologiche
 - D** le infezioni ospedaliere
-

2 Quale tra i seguenti principi attivi è un antiemetico?

- A** Nimesulide
 - B** Furosemide
 - C** Metoclopramide
 - D** Metformina
-

3 Per "deiscenza di una ferita" si intende:

- A** apertura o mancata chiusura delle labbra della ferita stessa
 - B** una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
 - C** una ferita che presenta cellule morte
 - D** una ferita che presenta adesioni con superfici contigue
-

4 Quali caratteristiche deve avere un sapone utilizzato per il lavaggio di un paziente ospedalizzato?

- A** Possono essere utilizzati tutti i tipi di saponi
 - B** PH neutro, poco schiumogeno, facile da risciacquare, non profumato, costo contenuto
 - C** PH leggermente basico per migliorare la disidratazione cutanea, facile da risciacquare, non profumato
 - D** Solo pH neutro e basso costo
-

5 Che cosa trasmettono le goccioline di Flügge?

- A** Toxoplasmosi
 - B** Sifilide
 - C** Infezioni respiratorie
 - D** Infezioni uro-genitali
-

6 L'estubazione del paziente nella sala operatoria comporta:

- A** aumento delle concentrazioni ambientali di gas anestetici
 - B** sollevamento delle polveri ambientali
 - C** aumento del rischio di contaminazione batteriologica
 - D** ridotta pressione del gettito dell'ossigeno
-

7 Quale posizione si deve far adottare sul lettino operatorio a un paziente candidato a un intervento di chirurgia toracica?

- A** Posizione supina con gli arti inferiori divaricati
 - B** Posizione litotomica
 - C** Posizione laterale
 - D** Posizione prona
-

Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta **ERRATO** per prevenire la sindrome da rapido svuotamento gastrico?

- A** Somministrare gli alimenti a temperatura ambiente, evitando le temperature estreme
 - B** Somministrare gli alimenti lentamente o diminuire la velocità di infusione
 - C** Preferire la somministrazione della dieta in bolo invece che in infusione continua
 - D** Far mantenere all'assistito la posizione di semi-Fowler per un'ora dopo la somministrazione della dieta
-

9 Dopo il livello sacrale, le sedi più frequenti di comparsa di lesioni da compressione sono:

- A** solo i lobi dell'orecchio
 - B** tuberosità ischiatiche e regione rotulea
 - C** scapole e lobi dell'orecchio
 - D** grande trocantere, tuberosità ischiatiche e talloni
-

10 In quali delle seguenti cavità corporee è possibile effettuare la rilevazione della temperatura corporea interna?

- A** Solo auricolare
 - B** Inguinale e vaginale
 - C** Ascellare, auricolare, inguinale
 - D** Orale, rettale, auricolare, vaginale
-

11 Il carcinoma della cervice uterina si associa in più del 95% dei casi a infezione da:

- A** Candida Albicans
 - B** virus di Epstein-Barr (EBV)
 - C** virus erpetico ottavo (HHV8)
 - D** Papillomavirus umano (HPV)
-

12 Per "accreditamento" si intende:

- A** un processo di valutazione e di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale
 - B** un sistema di requisiti minimi stabiliti da enti privati accreditati esteri
 - C** un processo di sola verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale
 - D** un processo di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Privato
-

13 Secondo il Profilo professionale dell'Infermiere (d.m. 739/1994), l'infermiere:

- A** contribuisce alla formazione del personale di supporto e degli studenti
 - B** contribuisce alla formazione degli studenti
 - C** contribuisce alla formazione del personale di supporto
 - D** non contribuisce alla formazione di altre figure
-

-
- 14 Tra le seguenti, la procedura diagnostica che utilizza isotopi radioattivi è:
- A** la risonanza magnetica
 - B** la scintigrafia
 - C** la miografia
 - D** la tomografia assiale computerizzata
-
- 15 Per un corretto posizionamento del sondino naso-gastrico bisogna predisporre, tra il materiale occorrente:
- A** strisce reattive o cartine al tornasole per il pH
 - B** lo sfigmomanometro
 - C** il pallone Ambu
 - D** una pinza Klemmer
-
- 16 Quale tecnica dev'essere utilizzata per l'igiene delle orecchie?
- A** Usare un bastoncino cotonato e detergere padiglione auricolare e condotto uditivo
 - B** Usare una salvietta ripiegata sul dito, tirando il padiglione auricolare verso il basso
 - C** Lasciare nel padiglione auricolare dei batuffoli imbibiti da ipoclorito di sodio
 - D** Applicare una crema sciogli-cerume nel condotto auricolare
-
- 17 Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione del dolore?
- A** VaS
 - B** Conley
 - C** Norton
 - D** Ramsay
-
- 18 Lo svuotamento manuale dell'ampolla rettale è una procedura invasiva che consente l'evacuazione di feci dal retto:
- A** attraverso tecnica endoscopica
 - B** con approccio chirurgico
 - C** utilizzando il dito indice della mano dominante
 - D** attraverso drenaggio aspirativo
-
- 19 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da meningite meningococcica, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?
- A** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare una mascherina protettiva prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso e occhiali nei contatti col malato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso e filtrante facciale a protezione 10 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
-

Una persona affetta da diabete di tipo 2 in terapia con metformina potrebbe avvertire i seguenti effetti collaterali:

- A** aumento del peso corporeo
 - B** lipodistrofie, in particolar modo lipoipertrofie
 - C** disturbi gastrointestinali, per esempio diarrea
 - D** ipoglicemia notturna o prima dei pasti
-

21 L'unità di misura del catetere è:

- A** Charrière e corrisponde al diametro interno del catetere
 - B** Cartier e corrisponde al diametro esterno del catetere
 - C** Cartier e corrisponde al diametro interno del catetere
 - D** Charrière e corrisponde al diametro esterno del catetere
-

22 Indicare quale delle seguenti affermazioni rispetto alla palpazione come tecnica di esame fisico diretto è ERRATA.

- A** La palpazione profonda permette l'identificazione della sede e delle dimensioni degli organi e la presenza di eventuali masse anomale
 - B** La palpazione profonda comporta la compressione di un'area a una profondità di 3-5 cm mediante l'uso delle dita della mano dominante
 - C** Per non creare disagio all'assistito, dovrebbe essere eseguita con le mani calde e con un tocco delicato
 - D** Permette di percepire a livello addominale suoni fisiologici di tipo timpanico in sede gastrica e di tipo ottuso a livello epatico
-

23 Assistendo una persona con dolore, dopo quanto tempo dalla somministrazione della terapia antalgica per via endovenosa occorre rivalutare il sintomo?

- A** 15-30 minuti
 - B** 12 ore
 - C** 4 ore
 - D** Immediatamente
-

24 La medicazione di un catetere venoso centrale deve essere effettuata passando la soluzione disinfettante:

- A** dall'esterno verso l'interno a raggiera
 - B** dall'esterno verso l'interno in modo circolare
 - C** dall'interno verso l'esterno in modo circolare
 - D** dall'interno verso l'esterno a raggiera
-

25 Secondo il Codice deontologico dell'Infermiere, l'infermiere informa, coinvolge, educa e supporta:

- A** l'interessato e, con il suo libero consenso, le figure assistenziali di riferimento indicate dalla struttura ospedaliera
- B** esclusivamente l'interessato
- C** esclusivamente le persone di riferimento
- D** l'interessato e, con il suo libero consenso, le persone di riferimento

-
- 26 Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale?
- A** 5 ml
 - B** 7 ml
 - C** 3 ml
 - D** 9 ml
-

- 27 Per l'infermiere che assiste una persona con vomito a getto è prioritario:
- A** valutarne frequentemente lo stato di coscienza
 - B** controllarne la diuresi oraria
 - C** diminuirne l'idratazione
 - D** coprire la persona per evitare ipotermia
-

- 28 Se un infermiere commette un errore durante il turno di lavoro in ospedale e ne deriva una lesione e quindi un danno al paziente, in ambito penale:
- A** l'infermiere risponderà personalmente di quanto derivato
 - B** risponderà il medico responsabile della struttura ove lavorava l'infermiere
 - C** pagheranno entrambe le assicurazioni, quella dell'ospedale e quella dell'infermiere, in parti eguali
 - D** il danno residuo verrà pagato dall'assicurazione dell'ospedale
-

- 29 Quali possono essere le complicanze post-operatorie precoci dopo il confezionamento di una tracheostomia?
- A** Ostruzione/dislocazione della cannula, emorragia
 - B** Nessuna delle altre alternative è corretta
 - C** Dislocazione della cannula, ipertensione arteriosa polmonare
 - D** Dislocazione della cannula, ipertensione arteriosa
-

- 30 Quali sono i livelli pressori che definiscono l'ipertensione arteriosa?
- A** Pressione sistolica < 140 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
 - B** Pressione sistolica < 120 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
 - C** Pressione sistolica > 120 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
 - D** Pressione sistolica > 140 mmHg e/o pressione diastolica > 90 mmHg
-

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

- 31 In quale sede di rilevazione la temperatura è più alta?
- A** Auricolare
 - B** Ascellare
 - C** Rettale
 - D** Orale
-


12 In che anno è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale?

A 1999

B 1985

C 1992

D 1978



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 08

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 **La persona diabetica in trattamento con ipoglicemizzanti orali dovrebbe effettuare l'autocontrollo glicemico:**
- A** almeno quattro o cinque volte nell'arco della giornata, se ha valori glicemici stabili
 - B** almeno 2-3 volte alla settimana, includendo una misurazione nella fase postprandiale
 - C** quotidianamente prima dei pasti e prima di andare a dormire
 - D** attraverso il rilievo della chetonuria
-
- 2 **La temperatura rettale è normalmente:**
- A** nessuna delle altre alternative è corretta
 - B** inferiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
 - C** superiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
 - D** superiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare
-
- 3 **Secondo il d.m. 739/1994, l'infermiere può contribuire alla formazione del personale di supporto?**
- A** Sì, ma solo in caso di carenze della struttura preposta
 - B** No, mai
 - C** Sì, sempre
 - D** Sì, ma solo per le attività riabilitative
-
- 4 **I farmaci LASA sono farmaci:**
- A** generici o equivalenti
 - B** a base di mesalazina
 - C** utilizzati nelle sperimentazioni cliniche
 - D** con nomi o confezioni simili tra loro
-
- 5 **Se il paziente collabora durante il posizionamento del sondino naso-gastrico, mentre si inserisce il sondino nella narice gli si chiede di:**
- A** inclinare la testa leggermente indietro
 - B** inclinare la testa in avanti
 - C** inclinare la testa a sinistra
 - D** non inclinare la testa
-
- 6 **Tra le seguenti opzioni, identificare quella in cui tutte e tre le patologie indicate sono trasmissibili per via aerea.**
- A** Morbillo, virus dell'epatite A, meningite
 - B** Morbillo, varicella, tubercolosi
 - C** Varicella, salmonella, meningite
 - D** Clostridium difficile, salmonella, varicella

Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, la palpazione:

- A** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
 - B** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
 - C** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
 - D** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio
-

8 In quale dei seguenti esami **NON** viene utilizzato un mezzo di contrasto?

- A** Colangio-RM
 - B** Arteriografia
 - C** Colangiografia
 - D** Urografia
-

9 L'analgesia controllata dal paziente (PCA) permette l'autosomministrazione del farmaco per alleviare il dolore. Quale informazione occorre fornire all'assistito per insegnarne l'utilizzo?

- A** Premere il pulsante esclusivamente se il dolore è severo (NRS > 7)
 - B** Dopo la somministrazione è programmato un periodo di blocco di 4-6 ore
 - C** Mantenere la posizione supina per almeno un'ora dopo la somministrazione
 - D** Dopo la somministrazione è programmato un periodo di blocco di alcuni minuti
-

10 Quali item sono valutati dalla scala di Braden?

- A** Percezione sensoriale, umidità della cute, attività motoria, nutrizione, frizione e scivolamento
 - B** Percezione sensoriale, secchezza delle mucose, attività motoria, nutrizione, temperatura basale
 - C** Umidità della cute, frizione e scivolamento, percezione sensoriale, pregresse lesioni da pressione
 - D** Nutrizione, pregresse lesioni da pressione, secchezza delle mucose, attività motoria, percezione sensoriale
-

11 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da legionellosi, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Non dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e filtrante facciale a protezione 10 nei contatti con il malato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, filtrante facciale a protezione 10 e occhiali nei contatti con il malato
 - D** Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in quanto la malattia non è trasmessa da persona a persona
-

12 Al rientro dalla sala operatoria dopo intervento per un'occlusione intestinale, l'infermiere effettua il primo controllo post-operatorio a una persona di 68 anni. Con quale frequenza è raccomandabile eseguire i successivi controlli dei parametri e delle condizioni cliniche del paziente?

- A** Ogni ora per le successive 24 ore
 - B** Dopo un'ora e poi pressione arteriosa e frequenza cardiaca ogni 6 ore, emocromo a 6-8 ore dal rientro in reparto e, se le condizioni sono stabili, al bisogno
 - C** Ogni ora per le prime 4 ore e successivamente ogni 4 ore
 - D** Il paziente necessita per almeno 48 ore di una presenza costante che possa segnalare al personale ogni variazione utile dei parametri vitali
-

13 Solitamente in gravidanza diminuisce:

- A** la gittata cardiaca
 - B** la motilità gastrointestinale
 - C** la frequenza urinaria
 - D** l'acidità gastrica
-

14 Quale metodica va seguita per la medicazione di una ferita asettica?

- A** La medicazione deve essere eseguita partendo dal centro della ferita sino alla periferia
 - B** La medicazione deve essere eseguita partendo dalla periferia della ferita sino al centro
 - C** La medicazione può essere eseguita in qualsiasi modo: è sufficiente che vengano utilizzati guanti sterili e disinfettanti non alcolici
 - D** La medicazione delle ferite asettiche deve essere eseguita solo dal personale medico negli ambienti specificatamente predisposti
-

15 La posizione consigliata per la persona con shock ipovolemico è:

- A** semiseduta, con testa e piedi sollevati
 - B** supina con arti inferiori sollevati
 - C** anti-Trendelenburg
 - D** supina con la testa a livello dei piedi
-

16 La manovra del "finger sweep" è da attuare, in un soggetto con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, solo nel caso in cui:

- A** il corpo estraneo sia visibile e vi siano due soccorritori
 - B** il corpo estraneo sia di materiale liquido
 - C** il corpo estraneo non sia visibile
 - D** il corpo estraneo sia visibile
-

17 Il lavaggio sociale delle mani:

- A** non è necessario se si indossano i guanti
 - B** prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
 - C** si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
 - D** si effettua solo dopo aver effettuato una medicazione
-

18 Quale delle seguenti sostanze NON è un disinfettante?

- A** Benzalconio cloruro
 - B** Perossido di idrogeno
 - C** Soluzione di cloruro di sodio al 9%
 - D** Polivinilpirrolidone-iodio
-

Per le strutture sanitarie che erogano prestazioni e servizi nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, l'Istituto dell'accreditamento è:

- A** un vincolo normativo esclusivo per gli enti sanitari ecclesiastici
 - B** un vincolo normativo esclusivo per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Sociale
 - C** un atto volontaristico solo per le aziende appartenenti alle Regioni e Province autonome
 - D** un vincolo normativo introdotto dal d.lgs. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni
-

20 Indicare quali, tra i seguenti valori di Kaliemia, possono essere considerati normali nell'adulto.

- A** 3,5-5 mEq/L
 - B** 3,5-7 mEq/L
 - C** 3,5-6 mEq/L
 - D** 1,5-3,5 mEq/L
-

21 Secondo il Codice deontologico, in caso di calamità, l'infermiere:

- A** deve contattare subito le forze dell'ordine
 - B** deve contattare subito i parenti dei pazienti
 - C** si mette a disposizione dell'autorità competente
 - D** è autorizzato a praticare un ALS
-

22 Quale dei seguenti cateteri vescicali è semirigido e ha un'angolazione di 30°?

- A** Foley
 - B** Tiemann
 - C** Nelaton
 - D** Foley con sonda termica
-

23 Per quale motivo è necessario far rimuovere alla persona le protesi dentarie mobili prima del suo ingresso in camera operatoria?

- A** Per evitare il rischio di caduta solo nelle vie digestive con ostruzione delle stesse
 - B** Per evitare il rischio di caduta nel retrobocca/vie aeree/vie digestive con ostruzione delle stesse
 - C** Per evitare il rischio di caduta nella cavità nasale con ostruzione della stessa
 - D** Per evitare il rischio di caduta in bocca/retrobocca ed espulsione delle protesi
-

24 Che cosa è necessario fare per eseguire la rasatura della barba di un paziente ad alto rischio emorragico?

- A** Stendere la schiuma da barba, usare una lametta sterilizzata e radere contro la direzione della crescita del pelo
 - B** Scaldare la barba con un asciugamano caldo, stendere la schiuma da barba, usare una lametta monouso radendo nella direzione di crescita del pelo
 - C** Stendere la schiuma da barba, usare una lametta, tendere la pelle e radere con movimenti più ampi sul mento e stretti sulle guance
 - D** Scaldare la barba con un asciugamano caldo, stendere la schiuma da barba, usare un rasoio elettrico, tendere la pelle e radere nella direzione di crescita del pelo
-

-
- 25 **Nell'attività d'équipe, la responsabilità penale ricade:**
- A** solo sul capo-équipe e sui medici a lui più vicini
 - B** sull'operatore che ha causato il danno
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta
 - D** su ogni singolo componente, poiché è strettamente personale e individuale
-
- 26 **In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con angolatura di 10-15 gradi?**
- A** Iniezione intramuscolare con metodo a baionetta
 - B** Iniezione intramuscolare
 - C** Iniezione sottocutanea
 - D** Iniezione intradermica
-
- 27 **Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta ERRATO per la prevenzione di crampi addominali, flatulenza e distensione gastrica?**
- A** All'inizio della somministrazione, clampare la sonda gastrostomica o il sondino nasogastrico, rimuovere il tappo e successivamente connettere la siringa a cono centrale o il circuito
 - B** A ogni somministrazione, riempire la siringa a cono centrale con la formula alimentare, rimuovendo eventuali bolle d'aria formatesi durante l'aspirazione della stessa
 - C** Al termine della somministrazione, eseguire il lavaggio del lume, clampare la sonda e solo successivamente disconnettere la siringa o il circuito
 - D** Al termine dell'alimentazione eseguire un lavaggio del lume della sonda, disconnettere la siringa e solo successivamente clampare la sonda
-
- 28 **Quando si posiziona un catetere venoso periferico la rimozione del laccio emostatico avviene:**
- A** prima della rimozione del mandrino
 - B** dopo la rimozione del mandrino
 - C** dopo aver collegato la linea infusione
 - D** dopo avere effettuato il lavaggio con soluzione fisiologica
-
- 29 **Una lesione da decubito al primo stadio prevede:**
- A** un eritema reattivo
 - B** un eritema persistente alla digitopressione
 - C** la rimozione solo dell'epidermide
 - D** una lesione di diametro inferiore ai 5 cm
-
- 30 **Le feci acoliche sono feci:**
- A** che vengono emesse in assenza di coliche addominali ma con dolori di tipo colico
 - B** biancastre, tipiche di patologie epatiche
 - C** biancastre, tipiche di patologie infettive
 - D** che vengono emesse in concomitanza con coliche addominali
-

ESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

- 31 Il Servizio Sanitario Nazionale si fonda:
- A** sulla competizione con le strutture private
 - B** sul concetto di SSN come unico fornitore di prestazioni sanitarie
 - C** sul principio dell'universalità delle cure
 - D** sul coinvolgimento delle assicurazioni
-
- 32 La malattia che maggiormente predispone alle fratture nell'anziano è:
- A** l'IRA (insufficienza renale acuta)
 - B** l'ipertrofia prostatica
 - C** l'osteoporosi
 - D** la celiachia

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 09

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

1 La posizione consigliata per la persona con shock ipovolemico è:

- A** supina con arti inferiori sollevati
- B** semiseduta, con testa e piedi sollevati
- C** anti-Trendelenburg
- D** supina con la testa a livello dei piedi

2 Secondo il d.m. 739/1994, l'infermiere può contribuire alla formazione del personale di supporto?

- A** No, mai
- B** Sì, sempre
- C** Sì, ma solo in caso di carenze della struttura preposta
- D** Sì, ma solo per le attività riabilitative

3 Quando si posiziona un catetere venoso periferico la rimozione del laccio emostatico avviene:

- A** prima della rimozione del mandrino
- B** dopo la rimozione del mandrino
- C** dopo aver collegato la linea infusione
- D** dopo avere effettuato il lavaggio con soluzione fisiologica

4 Lo svuotamento manuale dell'ampolla rettale è una procedura invasiva che consente l'evacuazione di feci dal retto:

- A** attraverso drenaggio aspirativo
- B** con approccio chirurgico
- C** attraverso tecnica endoscopica
- D** utilizzando il dito indice della mano dominante

5 In quale dei seguenti esami NON viene utilizzato un mezzo di contrasto?

- A** Colangiografia
- B** Arteriografia
- C** Colangio-RM
- D** Urografia

6 L'estubazione del paziente nella sala operatoria comporta:

- A** aumento del rischio di contaminazione batteriologica
- B** sollevamento delle polveri ambientali
- C** aumento delle concentrazioni ambientali di gas anestetici
- D** ridotta pressione del gettito dell'ossigeno

7 Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale?

- A** 5 ml
- B** 7 ml
- C** 3 ml
- D** 9 ml

Indicare quale delle seguenti affermazioni rispetto alla palpazione come tecnica di esame fisico diretto è **ERRATA**.

- A** Per non creare disagio all'assistito, dovrebbe essere eseguita con le mani calde e con un tocco delicato
- B** La palpazione profonda comporta la compressione di un'area a una profondità di 3-5 cm mediante l'uso delle dita della mano dominante
- C** Permette di percepire a livello addominale suoni fisiologici di tipo timpanico in sede gastrica e di tipo ottuso a livello epatico
- D** La palpazione profonda permette l'identificazione della sede e delle dimensioni degli organi e la presenza di eventuali masse anomale

9 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta **ERRATO** per prevenire la sindrome da rapido svuotamento gastrico?

- A** Preferire la somministrazione della dieta in bolo invece che in infusione continua
- B** Somministrare gli alimenti lentamente o diminuire la velocità di infusione
- C** Somministrare gli alimenti a temperatura ambiente, evitando le temperature estreme
- D** Far mantenere all'assistito la posizione di semi-Fowler per un'ora dopo la somministrazione della dieta

10 Il lavaggio sociale delle mani:

- A** si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
- B** non è necessario se si indossano i guanti
- C** prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
- D** si effettua solo dopo aver effettuato una medicazione

11 Per l'infermiere che assiste una persona con vomito a getto è prioritario:

- A** diminuirne l'idratazione
- B** controllarne la diuresi oraria
- C** valutarne frequentemente lo stato di coscienza
- D** coprire la persona per evitare ipotermia

12 I farmaci **LASA** sono farmaci:

- A** con nomi o confezioni simili tra loro
- B** a base di mesalazina
- C** utilizzati nelle sperimentazioni cliniche
- D** generici o equivalenti

13 Per un corretto posizionamento del sondino naso-gastrico bisogna predisporre, tra il materiale occorrente:

- A** strisce reattive o cartine al tornasole per il pH
- B** lo sfigmomanometro
- C** il pallone Ambu
- D** una pinza Klemmer

-
- 14 Il carcinoma della cervice uterina si associa in più del 95% dei casi a infezione da:
- A** virus erpetico ottavo (HHV8)
 - B** virus di Epstein-Barr (EBV)
 - C** Papillomavirus umano (HPV)
 - D** Candida Albicans
-
- 15 Quali sono i livelli pressori che definiscono l'ipertensione arteriosa?
- A** Pressione sistolica > 120 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
 - B** Pressione sistolica < 120 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
 - C** Pressione sistolica > 140 mmHg e/o pressione diastolica > 90 mmHg
 - D** Pressione sistolica < 140 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
-
- 16 La temperatura rettale è normalmente:
- A** superiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare
 - B** inferiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta
 - D** superiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
-
- 17 Quale dei seguenti cateteri vescicali è semirigido e ha un'angolazione di 30°?
- A** Foley
 - B** Tiemann
 - C** Nelaton
 - D** Foley con sonda termica
-
- 18 Per quale motivo è necessario far rimuovere alla persona le protesi dentarie mobili prima del suo ingresso in camera operatoria?
- A** Per evitare il rischio di caduta nel retrobocca/vie aeree/vie digestive con ostruzione delle stesse
 - B** Per evitare il rischio di caduta solo nelle vie digestive con ostruzione delle stesse
 - C** Per evitare il rischio di caduta nella cavità nasale con ostruzione della stessa
 - D** Per evitare il rischio di caduta in bocca/retrobocca ed espulsione delle protesi
-
- 19 Che cosa trasmettono le goccioline di Flügge?
- A** Infezioni respiratorie
 - B** Sifilide
 - C** Toxoplasmosi
 - D** Infezioni uro-genitali
-
- 20 Quale delle seguenti sostanze NON è un disinfettante?
- A** Polivinilpirrolidone-iodio
 - B** Perossido di idrogeno
 - C** Benzalconio cloruro
 - D** Soluzione di cloruro di sodio al 9%

Quale metodica va seguita per la medicazione di una ferita asettica?

- A** La medicazione deve essere eseguita partendo dal centro della ferita sino alla periferia
- B** La medicazione deve essere eseguita partendo dalla periferia della ferita sino al centro
- C** La medicazione può essere eseguita in qualsiasi modo: è sufficiente che vengano utilizzati guanti sterili e disinfettanti non alcolici
- D** La medicazione delle ferite asettiche deve essere eseguita solo dal personale medico negli ambienti specificatamente predisposti

22 Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione del dolore?

- A** Conley
- B** VaS
- C** Norton
- D** Ramsay

23 Per "accreditamento" si intende:

- A** un processo di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Privato
- B** un sistema di requisiti minimi stabiliti da enti privati accreditati esteri
- C** un processo di sola verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale
- D** un processo di valutazione e di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale

24 Nell'attività d'équipe, la responsabilità penale ricade:

- A** nessuna delle altre alternative è corretta
- B** sull'operatore che ha causato il danno
- C** su ogni singolo componente, poiché è strettamente personale e individuale
- D** solo sul capo-équipe e sui medici a lui più vicini

25 Secondo il Codice deontologico, in caso di calamità, l'infermiere:

- A** è autorizzato a praticare un ALS
- B** deve contattare subito i parenti dei pazienti
- C** deve contattare subito le forze dell'ordine
- D** si mette a disposizione dell'autorità competente

26 Dopo il livello sacrale, le sedi più frequenti di comparsa di lesioni da compressione sono:

- A** grande trocantere, tuberosità ischiatiche e talloni
- B** tuberosità ischiatiche e regione rotulea
- C** scapole e lobi dell'orecchio
- D** solo i lobi dell'orecchio

-
- 27 **Quale tecnica dev'essere utilizzata per l'igiene delle orecchie?**
- A** Lasciare nel padiglione auricolare dei batuffoli imbibiti da ipoclorito di sodio
 - B** Usare un bastoncino cotonato e detergere padiglione auricolare e condotto uditivo
 - C** Usare una salvietta ripiegata sul dito, tirando il padiglione auricolare verso il basso
 - D** Applicare una crema sciogli-cerume nel condotto auricolare
-
- 28 **L'analgesia controllata dal paziente (PCA) permette l'autosomministrazione del farmaco per alleviare il dolore. Quale informazione occorre fornire all'assistito per insegnarne l'utilizzo?**
- A** Dopo la somministrazione è programmato un periodo di blocco di 4-6 ore
 - B** Dopo la somministrazione è programmato un periodo di blocco di alcuni minuti
 - C** Mantenere la posizione supina per almeno un'ora dopo la somministrazione
 - D** Premere il pulsante esclusivamente se il dolore è severo (NRS > 7)
-
- 29 **Una persona affetta da diabete di tipo 2 in terapia con metformina potrebbe avvertire i seguenti effetti collaterali:**
- A** aumento del peso corporeo
 - B** lipodistrofie, in particolar modo lipoipertrofia
 - C** disturbi gastrointestinali, per esempio diarrea
 - D** ipoglicemia notturna o prima dei pasti
-
- 30 **Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da legionellosi, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?**
- A** Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in quanto la malattia non è trasmessa da persona a persona
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e filtrante facciale a protezione 10 nei contatti con il malato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, filtrante facciale a protezione 10 e occhiali nei contatti con il malato
 - D** Non dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

-
- 31 **Il Servizio Sanitario Nazionale si fonda:**
- A** sulla competizione con le strutture private
 - B** sul concetto di SSN come unico fornitore di prestazioni sanitarie
 - C** sul principio dell'universalità delle cure
 - D** sul coinvolgimento delle assicurazioni
-
- 32 **In quale sede di rilevazione la temperatura è più alta?**
- A** Ascellare
 - B** Rettale
 - C** Auricolare
 - D** Orale