



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
di n. 2 posti nel Profilo professionale di  
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –  
Cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda  
Ospedaliero Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara**

**PROVA SCRITTA – PROVA 04**

**NON STRAPPARE**

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA  
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**

- 
- 1 **Quale delle seguenti affermazioni riferite al lavaggio sociale delle mani NON è corretta?**
- A** È necessario usare lo spazzolino per le unghie
  - B** È necessario togliere tutti i monili
  - C** Bisogna asciugare le mani con salviette monouso
  - D** La procedura deve durare 40-60 secondi
- 
- 2 **In quale dei seguenti casi è opportuno considerare l'utilizzo di alternative al cateterismo vescicale in favore di dispositivi meno invasivi?**
- A** Paziente di sesso maschile, collaborante, senza problemi di ritenzione urinaria o di ostruzione vescicale
  - B** Paziente di sesso maschile, collaborante, con problemi di ritenzione urinaria e ostruzione vescicale
  - C** Paziente di sesso femminile, non collaborante, in stato di shock ipovolemico
  - D** Paziente di sesso femminile, collaborante, con gonfiore al di sopra della sinfisi pubica, sottoposta poche ore prima ad anestesia spinale
- 
- 3 **Il trattamento della chetoacidosi diabetica prevede, oltre alla somministrazione d'insulina:**
- A** la somministrazione di diuretici dell'ansa
  - B** la somministrazione di glucagone per via intramuscolare
  - C** l'infusione di soluzioni aminoacide tamponate con insulina
  - D** l'infusione, per via endovenosa, di soluzione fisiologica e reidratante
- 
- 4 **Quali sono le principali funzioni dell'assistenza infermieristica, secondo quanto stabilito dal d.m. 739/1994 (Profilo professionale dell'infermiere)?**
- A** Identificazione dei bisogni clinici, pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici
  - B** Sostenere, assistere e informare la persona e la collettività
  - C** Prevenzione delle malattie, assistenza dei malati e dei disabili, educazione sanitaria
  - D** Collaborazione con gli altri operatori sanitari nel rispetto delle loro specifiche competenze
- 
- 5 **A quale livello deve essere mantenuta la sacca di raccolta delle urine collegata al catetere vescicale?**
- A** Al livello della vescica
  - B** Al di sotto del livello della vescica
  - C** Al di sopra del livello della vescica
  - D** Non è importante considerare il livello rispetto alla vescica
- 
- 6 **Quale tra i seguenti presidi è utile nella profilassi trombo-embolica post-chirurgica?**
- A** Antibiotici ad ampio spettro
  - B** Statine
  - C** Acido folico
  - D** Eparina a basso peso molecolare

---

La scala di Aldrete viene utilizzata per la valutazione della giusta dimissione dalla sala risveglio di un paziente operato. Quali sono i criteri che l'infermiere valuta con l'ausilio di tale scala?

- A** Dolore, vomito post-operatorio, stabilità respiratoria, stabilità emodinamica
  - B** Livello di coscienza, attività fisica, stabilità emodinamica, stabilità respiratoria, saturazione d'ossigeno, presenza di nausea e vomito
  - C** Attività muscolare, respirazione, circolazione, livello di coscienza, saturazione d'ossigeno
  - D** Coscienza, respirazione, vomito post-operatorio, ipotermia
- 

8 La trasmissione del vibrione del colera avviene principalmente:

- A** per via oro-fecale
  - B** tramite contatto da persona a persona
  - C** tramite goccioline di Flügge
  - D** per via respiratoria
- 

9 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale somministrata da sondino nasogastrico, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta corretto?

- A** Somministrare la dieta immediatamente dopo averla prelevata dal frigorifero, per prevenirne la degradazione
  - B** Dopo aver eseguito la valutazione del ristagno gastrico, eliminare il materiale prelevato per evitare che l'accumulo eccessivo di liquido all'interno dello stomaco provochi vomito durante la somministrazione della dieta
  - C** Dopo la valutazione del ristagno gastrico, re-infondere dal sondino tutto il materiale prelevato per evitare lo squilibrio idroelettrolitico
  - D** Somministrare l'alimentazione e, se di durata superiore alle 72 ore, evitare di interromperla per sostituire flaconi e circuito, per evitarne la contaminazione
- 

10 Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, la percussione:

- A** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
  - B** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area, al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
  - C** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
  - D** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio
- 

11 Secondo il Codice deontologico, la relazione di cura stabilita dall'infermiere nell'agire professionale viene costruita anche utilizzando quale dei seguenti elementi?

- A** Il dialogo
  - B** La prudenza
  - C** Il distacco professionale
  - D** La competenza tecnica
- 

12 La misurazione della temperatura dovrebbe essere effettuata:

- A** nelle stesse ore, ma non necessariamente nella stessa sede, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
  - B** nelle stesse ore e nella stessa sede utilizzando lo stesso termometro, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
  - C** nella stessa sede ma non necessariamente nelle stesse ore, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
  - D** variando le ore e la sede, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile in base alla sede utilizzata
-

- 
- 13 Il d.lgs. 502/1992 prevede che i cittadini:
- A** debbano utilizzare le strutture indicate dall'Azienda Sanitaria Locale al fine dell'ottimizzazione della strumentazione e delle risorse economiche disponibili
  - B** esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali
  - C** debbano utilizzare le strutture indicate dall'Azienda Sanitaria Locale al fine dell'ottimizzazione del personale e dei percorsi clinico-assistenziali
  - D** esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti sia nell'ambito dei soggetti accreditati sia con soggetti non riconosciuti
- 
- 14 Quali, tra i seguenti valori di natremia, possono essere considerati normali nell'adulto?
- A** 110-123 mEq/L
  - B** 147-158 mEq/L
  - C** 136-145 mEq/L
  - D** 93-107 mEq/L
- 
- 15 I tempi di digiuno preoperatorio, nel bambino e nell'adulto, per l'assunzione di latte vaccino, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:
- A** un'ora
  - B** 20 ore
  - C** 6 ore
  - D** 30 minuti
- 
- 16 Quali sono le zone a rischio per lesioni da pressione quando il malato assume il decubito laterale?
- A** Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo
  - B** Orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
  - C** Malleolo interno, polpacci, sacro, spalla, orecchio, coste, guance
  - D** Orecchio, coste, processi spinosi vertebrali, malleolo
- 
- 17 Quale tra i seguenti NON è un contraccettivo di barriera?
- A** Cappuccio cervicale
  - B** Profilattico
  - C** Diaframma
  - D** Contraccettivo ormonale
- 
- 18 Secondo la Raccomandazione Ministeriale per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici, le verifiche da effettuare prima della somministrazione sono:
- A** solo nome del farmaco, dose e velocità di somministrazione ed eventuale premedicazione
  - B** solo corrispondenza tra farmaco prescritto e quello pervenuto, nome del farmaco, dose e via di somministrazione
  - C** corrispondenza tra farmaco prescritto e quello pervenuto, nome del farmaco, dose, via di somministrazione, velocità di somministrazione, scadenza e integrità dei contenitori ed eventuale premedicazione
  - D** solo nome del farmaco, integrità dei contenitori e via di somministrazione
-

- 
- 19 **La Glasgow Coma Scale (GCS) è una scala di valutazione:**
- A** del grado di autonomia acquisito dal paziente con esito di trauma cranico
  - B** della coscienza dopo traumi cranici. Utilizza come test l'apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria
  - C** del tono muscolare, che viene utilizzata nei pazienti affetti da patologie neurologiche
  - D** delle funzioni cognitive nei soggetti con esiti di coma
- 
- 20 **Quale tra le seguenti tipologie di catetere vescicale è indicata per lo svuotamento vescicale pre-parto?**
- A** Nelaton
  - B** Tiemann
  - C** Foley
  - D** Foley con sonda termica
- 
- 21 **Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:**
- A** proteggere da infezioni
  - B** ritardare la cicatrizzazione
  - C** proteggere da parassiti
  - D** prevenire il sanguinamento
- 
- 22 **Quale posizione deve assumere un assistito durante la manovra di posizionamento di un drenaggio toracico?**
- A** Decubito laterale sinistro
  - B** Decubito supino o semi-seduto
  - C** Decubito prono
  - D** Posizione di Trendelenburg
- 
- 23 **Nell'assistere un paziente nel post-operatorio, si deve ricordare che il dolore può essere influenzato:**
- A** dall'ora di esecuzione dell'intervento chirurgico
  - B** dalla sede e dalla durata dell'intervento chirurgico
  - C** dal tipo di antisettico utilizzato per la preparazione cutanea
  - D** dalla durata del digiuno preoperatorio
- 
- 24 **La comparsa di ponfo durante l'esecuzione di iniezione intradermica indica che l'iniezione:**
- A** ha provocato la rottura di un vaso sanguigno
  - B** ha provocato una reazione allergica
  - C** è stata eseguita correttamente
  - D** è stata eseguita troppo superficialmente
- 
- 25 **Per eseguire l'igiene del cavo orale in un paziente incosciente è opportuno metterlo in posizione:**
- A** di Fowler
  - B** di Trendelenburg
  - C** seduta
  - D** laterale
-

---

26 Quale delle seguenti sostanze NON è un disinfettante?

- A** Clorexidina
- B** Polivinilpirrolidone-iodio
- C** Perossido di ossigeno
- D** Soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%

---

27 In ambito sanitario, la responsabilità penale è:

- A** solo del personale medico
- B** solo del professionista sanitario in possesso del titolo di Laurea
- C** del singolo
- D** solo di colui che riveste ruoli di responsabilità

---

28 Per eseguire una colon TC:

- A** si insuffla aria per via endorettale
- B** si esegue la TAC dell'addome in quattro fasi
- C** il mezzo di contrasto si somministra tramite il colonscopio
- D** si fa ingerire un cucchiaino di bario al paziente prima di posizionarlo

---

29 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire la disidratazione?

- A** Somministrare acqua ogni 4-6 ore e, alla fine di ogni pasto, valutare il bilancio idrico
- B** Somministrare acqua ogni 4-6 ore, sostituire la dieta con una a osmolarità maggiore e valutare il bilancio idrico
- C** Somministrare acqua ogni 2 ore e infondere la dieta a velocità rapida
- D** Somministrare acqua alla fine di ogni pasto e pesare il paziente una volta al giorno

---

30 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da scabbia, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti con il malato e con arredi, attrezzature e materiale potenzialmente contaminato
- B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, mascherina e occhiali nei contatti con il malato e con arredi, attrezzature e materiale potenzialmente contaminato
- C** Dovranno adottare sempre le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso solo se il soggetto presenta lesioni da grattamento
- D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana

**QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.**

---

31 L'educazione continua in medicina è obbligatoria:

- A** per la professione sanitaria medica
- B** per tutti i professionisti
- C** per tutti i professionisti della sanità
- D** solo per i dipendenti ospedalieri

---

32

**Il polso tibiale si localizza:**

- A** nell'incavo tra il muscolo bicipite e il tricipite
- B** dietro il malleolo mediano del piede
- C** nella fossa poplitea lungo la parete esterna del tendine mediano
- D** tra la fossa coronoidea e l'epicondilo mediale

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
di n. 2 posti nel Profilo professionale di  
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –  
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda  
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

**PROVA SCRITTA – PROVA 06**

**NON STRAPPARE**

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA  
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**

---

1 **Quale posizione deve assumere un assistito durante la manovra di posizionamento di un drenaggio toracico?**

- A** Decubito laterale sinistro
  - B** Decubito supino o semi-seduto
  - C** Decubito prono
  - D** Posizione di Trendelenburg
- 

2 **Uno degli scopi di una medicazione a piatto attuata su una ferita chirurgica semplice in via di normale guarigione è:**

- A** proteggere da infezioni
  - B** ritardare la cicatrizzazione
  - C** proteggere da parassiti
  - D** prevenire il sanguinamento
- 

3 **Una complicanza precoce della tracheostomia è:**

- A** l'enfisema sottocutaneo
  - B** la fistola tracheo-esofagea
  - C** l'infezione respiratoria
  - D** la stenosi tracheale
- 

4 **Oltre a un aumento dei valori della pressione venosa centrale, è un segno clinico d'insufficienza cardiaca destra:**

- A** la comparsa di polifagia
  - B** la comparsa di edemi declivi
  - C** la poliuria e conseguente polidipsia
  - D** la bradicardia
- 

5 **Quale tra le seguenti tipologie di catetere vescicale è indicata per lo svuotamento vescicale pre-parto?**

- A** Foley
  - B** Tiemann
  - C** Nelaton
  - D** Foley con sonda termica
- 

6 **Per eseguire una colon TC:**

- A** il mezzo di contrasto si somministra tramite il colonscopio
- B** si esegue la TAC dell'addome in quattro fasi
- C** si insuffla aria per via endorettale
- D** si fa ingerire un cucchiaino di bario al paziente prima di posizionarlo

---

**Secondo la Raccomandazione Ministeriale per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici, le verifiche da effettuare prima della somministrazione sono:**

- A** corrispondenza tra farmaco prescritto e quello pervenuto, nome del farmaco, dose, via di somministrazione, velocità di somministrazione, scadenza e integrità dei contenitori ed eventuale premedicazione
  - B** solo corrispondenza tra farmaco prescritto e quello pervenuto, nome del farmaco, dose e via di somministrazione
  - C** solo nome del farmaco, dose e velocità di somministrazione ed eventuale premedicazione
  - D** solo nome del farmaco, integrità dei contenitori e via di somministrazione
- 

**8 Si definisce "ipossia":**

- A** una pressione di O<sub>2</sub> al di sotto dei 60 cmH<sub>2</sub>O
  - B** una pressione di CO<sub>2</sub> al di sotto dei 60 mmHg
  - C** una pressione di O<sub>2</sub> al di sotto dei 60 mmHg
  - D** una condizione in cui prevale un metabolismo aerobico
- 

**9 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire la diarrea?**

- A** Somministrare una dieta iperosmolare a basso flusso, a basso contenuto idrico e a temperatura ambiente
  - B** Somministrare la dieta posizionando l'assistito in decubito supino
  - C** Aumentare l'apporto idrico e sostituire il preparato per nutrizione con una dieta a osmolarità maggiore
  - D** Somministrare lentamente una dieta a temperatura ambiente
- 

**10 Nell'assistere un paziente nel post-operatorio, si deve ricordare che il dolore può essere influenzato:**

- A** dal tipo di antisettico utilizzato per la preparazione cutanea
  - B** dall'ora di esecuzione dell'intervento chirurgico
  - C** dalla sede e dalla durata dell'intervento chirurgico
  - D** dalla durata del digiuno preoperatorio
- 

**11 Quale, tra le seguenti sostanze, è in grado di sterilizzare strumenti termosensibili o che contengono componenti elettronici?**

- A** Clorexidina
  - B** Ossido di etilene
  - C** Soluzione alcolica al 40%
  - D** Soluzione alcolica al 90%
- 

**12 I tempi di digiuno preoperatorio, nel bambino e nell'adulto, per l'assunzione di latte vaccino, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:**

- A** 20 ore
  - B** 6 ore
  - C** un'ora
  - D** 30 minuti
-

- 
- 13 **Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, l'auscultazione:**
- A** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
  - B** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
  - C** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
  - D** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio
- 
- 14 **Quali sono le zone a rischio per lesioni da pressione quando il malato assume il decubito laterale?**
- A** Orecchio, tallone, trocantere, coste, ginocchio interno, vertebre
  - B** Orecchio, parte laterale della spalla, coste, trocantere, malleolo
  - C** Malleolo interno, polpacci, sacro, spalla, orecchio, coste, guance
  - D** Orecchio, coste, processi spinosi vertebrali, malleolo
- 
- 15 **A una persona diabetica cosciente in ipoglicemia è indicato somministrare:**
- A** circa 50 g di carboidrati complessi, come fette biscottate, pane o cracker
  - B** 15 g di carboidrati semplici
  - C** una fetta di torta oppure 5-6 biscotti secchi
  - D** 5 g di glucosio in compresse
- 
- 16 **I pazienti con lesioni del cavo orale e i pazienti che non possono assumere liquidi per bocca hanno bisogno di sciacquare la bocca:**
- A** una o due volte al giorno e detergere la rima labiale per evitare la formazione di secrezioni
  - B** almeno ogni due ore e idratare le labbra con prodotti emollienti
  - C** solo dopo il pasto più abbondante della giornata e idratare le labbra con vaselina
  - D** con della pasta all'acqua profumata al mentolo almeno ogni due ore
- 
- 17 **Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta corretto applicare nel caso in cui sia necessario somministrare farmaci?**
- A** Polverizzare le compresse e scioglierle in acqua, somministrandole insieme alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
  - B** Polverizzare le compresse a rilascio prolungato o gastroprotette e somministrarle attraverso la sonda, lavandone accuratamente il lume con 30-50 ml di acqua per evitarne l'occlusione
  - C** Polverizzare le compresse e somministrarle in un'unica manovra, sciolte insieme in acqua, senza mischiarle alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
  - D** Polverizzare le compresse singolarmente e somministrarle una per volta, sciolte in acqua, senza mischiarle alla formula alimentare, lavando successivamente il lume della sonda con 30-50 ml di acqua
- 
- 18 **Il Codice Deontologico dell'Infermiere, pubblicato nel 2019, all'art. 1 definisce l'infermiere come:**
- A** il professionista sanitario responsabile dell'assistenza socio-sanitaria
  - B** l'operatore sanitario responsabile dell'assistenza sanitaria
  - C** il professionista sanitario, iscritto all'ordine delle professioni infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile
  - D** il professionista sanitario in possesso del diploma in Scienze infermieristiche
-

- 
- 19 **Quale tra le seguenti NON è un'indicazione al posizionamento di catetere vescicale?**
- A** Ritenzione urinaria o assenza di riflesso neurologico vescicale
  - B** Neoplasia del bacinetto renale o dell'uretere, per il quale sia stato posizionato uno stent
  - C** Mantenere la vescica vuota in caso di interventi chirurgici a carico delle vie urinarie
  - D** Quando è necessario iniettare mezzi di contrasto in vescica a scopo diagnostico
- 
- 20 **La comparsa di ponfo durante l'esecuzione di iniezione intradermica indica che l'iniezione:**
- A** è stata eseguita troppo superficialmente
  - B** ha provocato una reazione allergica
  - C** ha provocato la rottura di un vaso sanguigno
  - D** è stata eseguita correttamente
- 
- 21 **Le infezioni genitali da HPV nella donna hanno una rilevante importanza clinica perché:**
- A** sono molto comuni
  - B** possono degenerare in cancro, se sostenute soprattutto da alcuni genotipi
  - C** si associano quasi sempre a infezione batterica
  - D** sono molto dolorose
- 
- 22 **Quale delle seguenti attività NON rientra tra quelle attribuite alla professione infermieristica?**
- A** L'educazione sanitaria
  - B** La prevenzione
  - C** La diagnosi
  - D** L'assistenza sanitaria
- 
- 23 **In ambito sanitario, la responsabilità penale è:**
- A** solo del personale medico
  - B** solo del professionista sanitario in possesso del titolo di Laurea
  - C** del singolo
  - D** solo di colui che riveste ruoli di responsabilità
- 
- 24 **La misurazione della temperatura dovrebbe essere effettuata:**
- A** nelle stesse ore e nella stessa sede utilizzando lo stesso termometro, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
  - B** nelle stesse ore, ma non necessariamente nella stessa sede, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
  - C** nella stessa sede ma non necessariamente nelle stesse ore, utilizzando lo stesso termometro in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile
  - D** variando le ore e la sede, in modo che l'interpretazione delle variazioni sia più attendibile in base alla sede utilizzata
-

---

25 La trasmissione di *Salmonella typhi* avviene:

- A** per via oro-fecale
  - B** per via sessuale
  - C** per via aerea
  - D** per contatto parenterale
- 

26 Il d.lgs. 502/1992 prevede che i cittadini:

- A** debbano utilizzare le strutture indicate dall'Azienda Sanitaria Locale al fine dell'ottimizzazione della strumentazione e delle risorse economiche disponibili
  - B** esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali
  - C** debbano utilizzare le strutture indicate dall'Azienda Sanitaria Locale al fine dell'ottimizzazione del personale e dei percorsi clinico-assistenziali
  - D** esercitino la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti sia nell'ambito dei soggetti accreditati sia con soggetti non riconosciuti
- 

27 Quale tra le seguenti scale di misurazione del dolore valuta le risposte comportamentali e i parametri fisiologici?

- A** PAINAD: Pain Assessment in Advanced Dementia
  - B** VRS: Scala di Valutazione Verbale
  - C** NRS: Numeric Rating Scale
  - D** Wong-Baker Faces Pain Rating Scale
- 

28 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da scabbia, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Dovranno adottare sempre le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso solo se il soggetto presenta lesioni da grattamento
  - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, mascherina e occhiali nei contatti con il malato e con arredi, attrezzature e materiale potenzialmente contaminato
  - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti con il malato e con arredi, attrezzature e materiale potenzialmente contaminato
  - D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
- 

29 Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera?

- A** Le mani dell'operatore
  - B** I degenti
  - C** Le lenzuola e gli effetti personali del paziente
  - D** La strumentazione sanitaria
- 

30 A quale livello deve essere mantenuta la sacca di raccolta delle urine collegata al catetere vescicale?

- A** Al livello della vescica
  - B** Al di sotto del livello della vescica
  - C** Al di sopra del livello della vescica
  - D** Non è importante considerare il livello rispetto alla vescica
-

**QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.**

---

31 Il trattamento che permette di regolare la composizione del sangue di pazienti affetti da gravi malattie renali è detto:

- A** nefrite
  - B** nefrectomia
  - C** ematoma
  - D** emodialisi
- 

32 L'educazione continua in medicina è obbligatoria:

- A** solo per i dipendenti ospedalieri
- B** per tutti i professionisti
- C** per la professione sanitaria medica
- D** per tutti i professionisti della sanità