


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**



PROVA SCRITTA – PROVA 03

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

1 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da varicella, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Dovranno in ogni caso adottare solo le precauzioni standard e indossare guanti e camice nei contatti col malato
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato e, se non immuni, un filtrante facciale a protezione 2 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti, camice e occhiali nei contatti col malato e, se non immuni, una mascherina protettiva e copriscarpe
 - D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
-

2 Quale tra i seguenti è un effetto terapeutico dell'applicazione locale del freddo?

- A** Controlla il sanguinamento e il rilassamento muscolare
 - B** Diminuisce l'infiammazione accelerando i processi infiammatori e immunologici
 - C** Aumenta l'edema agendo sulla permeabilità capillare e venosa
 - D** Allevia il dolore diminuendo la velocità di conduzione nervosa
-

3 In quale posizione deve essere collocato il paziente incosciente che respira?

- A** Prona
 - B** Semiseduta
 - C** Supina
 - D** Laterale di sicurezza
-

4 Al momento della procedura assistenziale di posizionamento del catetere vescicale, la posizione da far assumere a un paziente di sesso femminile è:

- A** decubito dorsale con gambe flesse
 - B** decubito laterale con gambe flesse
 - C** decubito laterale con una gamba flessa sul lettino e l'altra gamba ipertesa
 - D** decubito dorsale con gambe iperestese
-

5 Nei pazienti in degenza protratta, la scala di Braden:

- A** dovrebbe essere rivalutata ogni sette giorni, ogniqualvolta le condizioni del paziente si modificano e alla dimissione
 - B** dovrebbe essere rivalutata almeno una volta ogni due settimane
 - C** dovrebbe essere rivalutata soltanto una volta al mese
 - D** non dovrebbe essere rivalutata
-

6 Quando il bilancio idrico è positivo si presentano tutte le seguenti condizioni ECCEPTE una. Quale?

- A** Un aumento della pressione arteriosa per un sovraccarico circolatorio
 - B** La persona assistita presenta una sensazione di sete intensa
 - C** L'introduzione di liquidi è maggiore della loro eliminazione
 - D** La formazione di edema
-

Una donna che NON ha mai partorito è definita:

- A** nullipara
 - B** nulligravida
 - C** primipara attempata
 - D** primigravida
-

8 Quale fra questi farmaci NON è un FANS?

- A** Paracetamolo
 - B** Ibuprofene
 - C** Indometacina
 - D** Acido acetilsalicilico
-

9 L'elettroencefalogramma serve a:

- A** misurare l'attività elettrica cerebrale
 - B** indagare la morfologia degli emisferi cerebrali
 - C** avere informazioni sull'attività metabolica dei neuroni
 - D** valutare il flusso ematico cerebrale
-

10 Quale delle seguenti affermazioni riguardo all'uso dei guanti come mezzo di barriera è corretta?

- A** I guanti sterili vanno indossati prima di venire in contatto con secreti ed escreti corporei
 - B** I guanti non sterili vanno indossati prima di reincappucciare gli aghi usati
 - C** I guanti riducono l'incidenza della contaminazione delle mani ma non prevengono le lesioni dovute ad aghi
 - D** I guanti sterili vanno indossati prima di indossare il camice sterile
-

11 L'igiene del cavo orale, l'aspirazione delle secrezioni e il posizionamento dell'assistito con il tronco sollevato di 30-45° sono interventi infermieristici atti a prevenire:

- A** l'insorgenza di lesioni a carico del cavo orale
 - B** la polmonite associata a intubazione endotracheale
 - C** la rimozione accidentale del catetere di Swan-Ganz
 - D** la dislocazione del tubo endotracheale
-

12 I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

- A** non possono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
 - B** devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
 - C** devono essere smaltiti mediante compostaggio
 - D** possono essere smaltiti mediante termodistruzione e compostaggio
-

13 Secondo l'O.M.S., per "ipertensione di grado 2" si intendono valori pressori superiori a:

- A** sistolica: 90 mmHg; diastolica: 160 mmHg
 - B** sistolica: 160 mmHg; diastolica: 100 mmHg
 - C** sistolica: 140 mmHg; diastolica: 90 mmHg
 - D** sistolica: 180 mmHg; diastolica: 115 mmHg
-

14 Quale fra le seguenti NON è sede di iniezione intramuscolare?

- A** Deltoidale
- B** Periglutea
- C** Ventroglutea
- D** Rettofemorale

15 In un paziente in posizione supina, le zone maggiormente a rischio di lesioni da pressione sono:

- A** occipite, regione sacrale, scapole, gomiti e talloni
- B** fronte, mento, torace, ginocchia e metacarpi
- C** malleoli interni, orecchie e naso
- D** ginocchio, trocantere e orecchio, nel lato di appoggio

16 Rispetto all'esame fisico diretto del torace, indicare quale tra le seguenti affermazioni è ERRATA.

- A** La palpazione permette di verificare la simmetria dell'espansione della parete toracica e la presenza simmetrica del fremito vocale tattile
- B** L'ispezione permette di rilevare dati relativi alla configurazione del torace, alle caratteristiche del respiro e ai segni di difficoltà respiratoria
- C** La percussione di un polmone fisiologico permette di percepire un suono ottuso, sordo e con ridotta risonanza
- D** L'auscultazione permette di percepire suoni respiratori fisiologici bronchiali, broncovescicolari e vescicolari e suoni respiratori avventizi anomali

17 È stato appena posizionato un sondino naso-gastrico per nutrizione enterale a un giovane in stato di incoscienza a seguito di un trauma cranico. Dopo la verifica tramite radiografia del corretto posizionamento della sonda, come l'infermiere dovrebbe gestire l'avvio dell'alimentazione?

- A** Inizia la miscela nutritiva a un flusso di 50 ml/h in infusione continua, controlla ogni 3 ore la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di rigurgito e diarrea
- B** Inizia dopo 48 ore la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla al termine di ogni miscela la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di vomito e diarrea
- C** Inizia dopo circa 48 ore la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla la pervietà del sondino e verifica la comparsa di febbre e dispnea
- D** Inizia la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla dopo 4-5 ore la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di tosse e dispnea

18 A quale tipologia di catetere appartiene il Port-a-Cath?

- A** Tunnellizzato
- B** Totalmente impiantabile
- C** A medio termine
- D** A breve termine

19 Indicare quale fra le seguenti manifestazioni cliniche NON è da considerarsi una complicanza cronica del diabete mellito.

- A** Pancreatite
- B** Neuropatia
- C** Vasculopatia
- D** Nefropatia

Quando il cittadino può accedere agli ambulatori e alle strutture private accreditate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio?

- A** Quando le strutture pubbliche non sono in grado di soddisfare la richiesta entro il termine stabilito dalla legge, previa autorizzazione del Comune
 - B** Il cittadino può accedervi liberamente e a sua scelta
 - C** Quando l'ASL non è in grado di soddisfare immediatamente la richiesta
 - D** Solo al mattino dalle ore 8:00 alle ore 10:00
-

21 Tutte le seguenti sono complicanze post-operatorie precoci, TRANNE:

- A** l'ipopotassiemia
 - B** la trombosi
 - C** l'embolia
 - D** le infezioni
-

22 Secondo la normativa inerente al Profilo professionale (d.m. Sanità 739/1994), con responsabilità dell'infermiere, ci si riferisce:

- A** alla sola responsabilità penale che deriva dall'esercizio della professione
 - B** alla sola obbligatorietà alla formazione continua
 - C** all'assistenza generale infermieristica
 - D** a nessuna delle altre alternative
-

23 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti nel caso in cui si sospetti l'aspirazione nelle vie aeree?

- A** Sospendere l'alimentazione, porre l'assistito in posizione semi-seduta, valutare il corretto posizionamento del sondino e avvisare il medico
 - B** Sospendere l'alimentazione, eseguire l'aspirazione delle vie aeree superiori, porre l'assistito in decubito laterale, abbassare la testiera del letto e avvisare il medico
 - C** Diminuire la velocità di infusione dell'alimentazione, auscultare i suoni polmonari, verificare l'assenza di tosse ed eventualmente aumentare gradualmente la velocità di somministrazione dell'alimentazione dopo aver avvisato il medico
 - D** Avvisare il medico, verificare i parametri respiratori, far mantenere all'assistito la posizione semi-seduta e, se non ci sono complicanze, continuare la somministrazione della dieta
-

24 Come si definisce la violazione commessa dall'operatore sanitario che altera una cartella clinica?

- A** Falso materiale
 - B** Falso di referto medico
 - C** Falso d'ufficio interno
 - D** Falso formale
-

25 La prevenzione delle complicanze tromboemboliche nella persona operata si basa su tutte le seguenti prestazioni TRANNE una: quale?

- A** Mantenere la persona a letto
 - B** Far svolgere esercizi attivi o passivi degli arti inferiori durante la permanenza a letto
 - C** Applicare calze elastiche durante la permanenza a letto
 - D** Idratare il paziente
-

26 L'irrigazione di una ferita si effettua utilizzando:

- A** siringa da 5 ml e ago da 23 G
 - B** siringa da 15 ml e ago da 19 G
 - C** siringa da 35 ml e ago da 19 G
 - D** siringa da 35 ml e ago da 23 G
-

27 Se il colore delle urine ha l'aspetto definito "lavatura di carne", si è in presenza di:

- A** nicturia
 - B** ematuria
 - C** piuria
 - D** stranguria
-

28 Come si rileva la temperatura differenziale in un paziente?

- A** Misurando la temperatura ascellare per due volte a distanza di un'ora
 - B** Calcolando la differenza di temperatura tra rilevazione rettale e ascellare
 - C** Misurando la temperatura ascellare e la temperatura orale
 - D** Calcolando la differenza di temperatura tra rilevazione rettale eseguita al mattino e rilevazione ascellare eseguita alla sera
-

29 Secondo il Codice deontologico, l'infermiere agisce in base:

- A** alle direttive impartite dal personale medico
 - B** alle direttive impartite dalla struttura sanitaria
 - C** alla propria disponibilità
 - D** al proprio livello di competenza
-

30 La trasmissione dell'epatite C (HCV):

- A** avviene per via respiratoria
 - B** avviene per via ematica
 - C** non è dimostrata scientificamente
 - D** avviene tramite gli alimenti
-

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 Secondo la Costituzione italiana, la salute:

- A** è la semplice assenza di malattia
 - B** è un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività
 - C** non può essere annoverata tra i diritti dell'individuo
 - D** è un bene fondamentale del singolo individuo
-

,2

Il termine "dispnea" significa:

- A** frequenza respiratoria aumentata
- B** difficoltà respiratoria: il paziente può riferire fame d'aria o fiato corto
- C** frequenza respiratoria diminuita
- D** assenza di respiro dovuta a un atto volontario

W. B. Q.