

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda
Ospedaliero Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 01

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 Individuare il comportamento corretto relativamente al digiuno preoperatorio.**
- A** L'indicazione non è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, al tipo di alimenti, all'età e alle condizioni respiratorie del paziente e il digiuno deve iniziare sempre almeno 8 ore prima dell'intervento chirurgico
 - B** L'indicazione è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, al tipo di alimenti, all'età e alle condizioni respiratorie del paziente
 - C** L'indicazione non è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, al tipo di alimenti, all'età e alle condizioni respiratorie del paziente e il digiuno deve iniziare sempre almeno 12 ore prima dell'intervento chirurgico
 - D** L'indicazione è diversa in relazione al tipo di intervento chirurgico, alle condizioni respiratorie del paziente e alla terapia farmacologica prescritta e assunta
-
- 2 L'ormone prodotto dal trofoblasto è:**
- A** la gonadotropina corionica
 - B** il progesterone
 - C** l'estriolo
 - D** il cortisolo
-
- 3 Quale fra questi farmaci NON è un FANS?**
- A** Acido acetilsalicilico
 - B** Ibuprofene
 - C** Indometacina
 - D** Paracetamolo
-
- 4 In un paziente in posizione supina, le zone maggiormente a rischio di lesioni da pressione sono:**
- A** malleoli interni, orecchie e naso
 - B** fronte, mento, torace, ginocchia e metacarpi
 - C** occipite, regione sacrale, scapole, gomiti e talloni
 - D** ginocchio, trocantere e orecchio, nel lato di appoggio
-
- 5 L'elettroencefalogramma serve a:**
- A** indagare la morfologia degli emisferi cerebrali
 - B** misurare l'attività elettrica cerebrale
 - C** avere informazioni sull'attività metabolica dei neuroni
 - D** valutare il flusso ematico cerebrale
-
- 6 La prevenzione delle complicanze tromboemboliche nella persona operata si basa su tutte le seguenti prestazioni TRANNE una: quale?**
- A** Mantenere la persona a letto
 - B** Far svolgere esercizi attivi o passivi degli arti inferiori durante la permanenza a letto
 - C** Applicare calze elastiche durante la permanenza a letto
 - D** Idratare il paziente

È opportuno che la persona diabetica in trattamento insulinico svolga attività fisica. Quali informazioni le saranno fornite per consentirle di svolgerla senza rischi di complicanze?

- A** È da rimandare se le urine contengono nitriti
 - B** È consigliabile svolgerla sempre alla stessa ora della giornata
 - C** È preferibile non assumere alimenti prima di effettuarla
 - D** È consigliabile eseguire l'autocontrollo glicemico prima di iniziare
-

8 Se il colore delle urine ha l'aspetto definito "lavatura di carne", si è in presenza di:

- A** nicturia
 - B** ematuria
 - C** piuria
 - D** stranguria
-

9 Per ottenere l'effetto desiderato dei disinfettanti si devono osservare regole ben precise. Quale tra i seguenti sistemi di conservazione NON è corretto?

- A** Apporre la data di apertura sulla confezione
 - B** Conservare il prodotto in luoghi freschi e asciutti
 - C** Non appoggiare mai sull'apertura della confezione garze, cotone, mani, ecc.
 - D** Lasciare aperta la confezione
-

10 La scala di Oucher viene utilizzata per quantificare il dolore nei pazienti:

- A** con dolore cronico
 - B** anziani
 - C** adolescenti
 - D** pediatrici
-

11 Secondo la normativa inerente al Profilo professionale (d.m. Sanità 739/1994), con responsabilità dell'infermiere, ci si riferisce:

- A** alla sola obbligatorietà alla formazione continua
 - B** all'assistenza generale infermieristica
 - C** alla sola responsabilità penale che deriva dall'esercizio della professione
 - D** a nessuna delle altre alternative
-

12 L'infermiere dovrebbe sospettare una disidratazione se l'anziano che assiste manifesta:

- A** aumento della pressione arteriosa, dolore osteoarticolare, debolezza
- B** mal di testa, comparsa di arrossamento cutaneo, difficoltà nel parlare
- C** diminuzione della temperatura corporea, comparsa di brividi, delirio ed ematemesi
- D** riduzione della pressione arteriosa, aumento repentino del peso corporeo e della diuresi

-
- 13 **Dovendo disinfettare una ferita lacero-contusa sporca di terra, è opportuno utilizzare:**
- A** alcol denaturato
 - B** acqua fredda corrente
 - C** acqua calda corrente
 - D** acqua ossigenata
-
- 14 **Nell'assistenza durante l'esame pelvico, in quale decubito si dovrà fare posizionare la donna?**
- A** Posizione prona
 - B** Posizione genupettorale
 - C** Posizione supina
 - D** Posizione litotomica
-
- 15 **È stato appena posizionato un sondino naso-gastrico per nutrizione enterale a un giovane in stato di incoscienza a seguito di un trauma cranico. Dopo la verifica tramite radiografia del corretto posizionamento della sonda, come l'infermiere dovrebbe gestire l'avvio dell'alimentazione?**
- A** Inizia dopo circa 48 ore la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla la pervietà del sondino e verifica la comparsa di febbre e dispnea
 - B** Inizia dopo 48 ore la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla al termine di ogni miscela la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di vomito e diarrea
 - C** Inizia la miscela nutritiva a un flusso di 50 ml/h in infusione continua, controlla ogni 3 ore la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di rigurgito e diarrea
 - D** Inizia la miscela nutritiva a un flusso di 100 ml/h in infusione continua, controlla dopo 4-5 ore la quantità del ristagno gastrico e verifica la comparsa di tosse e dispnea
-
- 16 **Tra i criteri generali per la terapia del dolore, c'è l'importanza di somministrare i farmaci:**
- A** prima delle ore notturne
 - B** prima che compaia il dolore
 - C** al bisogno
 - D** solo se il dolore è insopportabile
-
- 17 **Come si rileva la temperatura differenziale in un paziente?**
- A** Calcolando la differenza di temperatura tra rilevazione rettale eseguita al mattino e rilevazione ascellare eseguita alla sera
 - B** Misurando la temperatura ascellare per due volte a distanza di un'ora
 - C** Misurando la temperatura ascellare e la temperatura orale
 - D** Calcolando la differenza di temperatura tra rilevazione rettale e ascellare
-
- 18 **Secondo l'O.M.S., per "ipertensione di grado 2" si intendono valori pressori superiori a:**
- A** sistolica: 140 mmHg; diastolica: 90 mmHg
 - B** sistolica: 90 mmHg; diastolica: 160 mmHg
 - C** sistolica: 160 mmHg; diastolica: 100 mmHg
 - D** sistolica: 180 mmHg; diastolica: 115 mmHg
-

Indicare quale delle seguenti affermazioni rispetto alla palpazione come tecnica di esame fisico diretto è ERRATA.

- A** Per l'esame dell'addome si utilizza esclusivamente la palpazione superficiale per non causare dolore all'assistito
 - B** Prevede l'uso delle dita e delle mani per raccogliere dati attraverso il tatto
 - C** Permette di determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza degli organi, la presenza di masse o liquidi
 - D** La palpazione superficiale viene eseguita premendo tre o quattro dita della mano dominante su un'area della cute dell'assistito per circa 1,5-3 centimetri di profondità
-

20 La cura quotidiana del meato urinario in presenza di catetere vescicale prevede l'utilizzo di:

- A** pomata antibiotica
 - B** iodopovidone al 10%
 - C** clorexidina al 2%
 - D** acqua e sapone
-

21 In base al d.lgs. 502/1992, l'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture autorizzate:

- A** dallo Stato o dal Presidente del Consiglio
 - B** dalla Regione
 - C** dalla conferenza Stato-Regioni-Province
 - D** dal Ministero dell'Interno
-

22 In ambito sanitario, la rivelazione e l'utilizzo dei segreti d'ufficio sono perseguibili:

- A** sempre ma solo a querela di parte
 - B** solo dall'autorità sanitaria
 - C** sempre
 - D** a querela di parte se sono dolose
-

23 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da rosolia, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?

- A** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso e filtrante facciale a protezione 10 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, occhiali e camice monouso nei contatti con il malato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare una mascherina protettiva prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - D** Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi perché non vi è rischio di trasmissione interumana
-

24 Secondo il Codice deontologico, l'infermiere agisce in base:

- A** alle direttive impartite dalla struttura sanitaria
 - B** al proprio livello di competenza
 - C** alla propria disponibilità
 - D** alle direttive impartite dal personale medico
-

- 25 Al fine di ridurre il dolore durante l'iniezione intramuscolare, a quale velocità si dovrà somministrare il farmaco?
- A** 1 ml di farmaco ogni secondo
 - B** 3 ml di farmaco ogni 3 secondi
 - C** 1 ml di farmaco ogni 10 secondi
 - D** 5 ml di farmaco ogni 2 secondi
-
- 26 Quale tra i seguenti è un vettore della Rickettsiosi?
- A** Yersinia
 - B** Gatto
 - C** Filattera
 - D** Zecca
-
- 27 A quale tipologia di catetere appartiene il Port-a-Cath?
- A** Totalmente impiantabile
 - B** Tunnellizzato
 - C** A medio termine
 - D** A breve termine
-
- 28 L'igiene del cavo orale, l'aspirazione delle secrezioni e il posizionamento dell'assistito con il tronco sollevato di 30-45° sono interventi infermieristici atti a prevenire:
- A** l'insorgenza di lesioni a carico del cavo orale
 - B** la polmonite associata a intubazione endotracheale
 - C** la rimozione accidentale del catetere di Swan-Ganz
 - D** la dislocazione del tubo endotracheale
-
- 29 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti nel caso in cui si sospetti l'aspirazione nelle vie aeree?
- A** Sospendere l'alimentazione, porre l'assistito in posizione semi-seduta, valutare il corretto posizionamento del sondino e avvisare il medico
 - B** Sospendere l'alimentazione, eseguire l'aspirazione delle vie aeree superiori, porre l'assistito in decubito laterale, abbassare la testiera del letto e avvisare il medico
 - C** Diminuire la velocità di infusione dell'alimentazione, auscultare i suoni polmonari, verificare l'assenza di tosse ed eventualmente aumentare gradualmente la velocità di somministrazione dell'alimentazione dopo aver avvisato il medico
 - D** Avvisare il medico, verificare i parametri respiratori, far mantenere all'assistito la posizione semi-seduta e, se non ci sono complicanze, continuare la somministrazione della dieta
-
- 30 I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
- A** devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
 - B** non possono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati
 - C** devono essere smaltiti mediante compostaggio
 - D** possono essere smaltiti mediante termodistruzione e compostaggio


QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, come viene assicurata la tutela della salute?

- A** Tramite il Servizio Sanitario Statale
 - B** Tramite i Servizi sanitari del Ministero della Salute
 - C** Tramite gli ospedali pubblici e privati presenti sul territorio
 - D** Tramite il Servizio Sanitario Nazionale e regionale
-

32 L'apnea è:

- A** la sospensione volontaria o involontaria dell'attività respiratoria
- B** l'aumento della frequenza del respiro determinato da sforzi prolungati o da alta quota
- C** l'aumento della frequenza del respiro determinato da gravi episodi febbrili
- D** il rallentamento della frequenza del respiro conseguente all'uso di farmaci ad azione sedativa




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 02



NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

-
- 1 Un paziente degente in terapia intensiva per complicanze post-operatorie ha in corso la nutrizione enterale attraverso sondino naso-gastrico. La miscela prescritta prevede l'integrazione di elementi nutrizionali quali arginina, glutammina, acidi grassi omega 3. Questa integrazione ha lo scopo di:
- A** migliorare la tollerabilità
 - B** migliorare la risposta immunitaria
 - C** migliorare la motilità
 - D** prevenire la comparsa di diarrea
-
- 2 La glicemia a digiuno nel soggetto sano ha valori:
- A** inferiori a 40 mg/dl
 - B** compresi tra 80 e 150 mg/dl
 - C** compresi tra 60 e 110 mg/dl
 - D** superiori a 150 mg/dl
-
- 3 Rispetto all'esame fisico diretto del torace, indicare quale tra le seguenti affermazioni è ERRATA.
- A** L'auscultazione permette di percepire suoni respiratori fisiologici bronchiali, broncovescicolari e vescicolari e suoni respiratori avventizi anomali
 - B** L'ispezione permette di rilevare dati relativi alla configurazione del torace, alle caratteristiche del respiro e ai segni di difficoltà respiratoria
 - C** La palpazione permette di verificare la simmetria dell'espansione della parete toracica e la presenza simmetrica del fremito vocale tattile
 - D** La percussione di un polmone fisiologico permette di percepire un suono ottuso, sordo e con ridotta risonanza
-
- 4 Quale delle seguenti affermazioni riguardo all'uso dei guanti come mezzo di barriera è corretta?
- A** I guanti non sterili vanno indossati prima di reincappucciare gli aghi usati
 - B** I guanti riducono l'incidenza della contaminazione delle mani ma non prevengono le lesioni dovute ad aghi
 - C** I guanti sterili vanno indossati prima di venire in contatto con secreti ed escreti corporei
 - D** I guanti sterili vanno indossati prima di indossare il camice sterile
-
- 5 La trasmissione dell'epatite C (HCV):
- A** non è dimostrata scientificamente
 - B** avviene per via respiratoria
 - C** avviene per via ematica
 - D** avviene tramite gli alimenti
-
- 6 I principali interventi volti a prevenire le lesioni da pressione nei soggetti a rischio sono:
- A** riposo a letto e dieta dimagrante
 - B** riposo a letto e nutrizione adeguata
 - C** mobilitazione dell'assistito, nutrizione adeguata e protezione della cute
 - D** nutrizione adeguata e sfregamento quotidiano della cute delle zone a rischio

7 Nell'adulto, i tempi di digiuno preoperatorio per l'assunzione di liquidi chiari o trasparenti, prima di una procedura di chirurgia elettiva, sono pari a:

- A** 16 ore
 - B** 2 ore
 - C** 18 ore
 - D** 15 minuti
-

8 In quale posizione deve essere collocato il paziente incosciente che respira?

- A** Prona
 - B** Semiseduta
 - C** Supina
 - D** Laterale di sicurezza
-

9 Quali onde presenta, in situazioni normali, un elettrocardiogramma?

- A** L'onda P, il complesso QRS, l'onda T, l'onda QRS, l'onda QRS-T
 - B** L'onda P, l'onda T, l'onda QRS
 - C** Nessuna delle altre alternative è corretta
 - D** L'onda P, il complesso QRS, l'onda T
-

10 Quando il bilancio idrico è positivo si presentano tutte le seguenti condizioni ECCEPPO una. Quale?

- A** Un aumento della pressione arteriosa per un sovraccarico circolatorio
 - B** La persona assistita presenta una sensazione di sete intensa
 - C** L'introduzione di liquidi è maggiore della loro eliminazione
 - D** La formazione di edema
-

11 La temperatura corporea misurata per via rettale:

- A** necessita di un tempo di misurazione di 5 minuti
 - B** risulta minore di 0,3 °C rispetto a quella orale
 - C** risulta maggiore di 0,5 °C rispetto a quella ascellare
 - D** risulta maggiore di 3 °C rispetto a quella ascellare
-

12 Un disinfettante si definisce batteriostatico quando:

- A** uccide i batteri inattivandoli
 - B** non è in grado di agire sui virus
 - C** elimina la carica batterica
 - D** inibisce la proliferazione batterica inattivando i microrganismi
-

13 Quale tra le seguenti è un'indicazione da dare a un assistito sottoposto a chemioterapia per eseguire l'igiene del cavo orale?

- A** Usare dei rilevatori di placca per rimuoverla completamente
 - B** Utilizzare spazzolini a setole dure
 - C** Usare garze morbide e filo interdentale ogni sera
 - D** Fare sciacqui con fisiologica e/o bicarbonato
-

14 Il Codice deontologico del 2019, nel Capo II, afferma che è responsabilità dell'infermiere:

- A** interagire con i colleghi
 - B** rispettare le direttive impartite dalla struttura sanitaria secondo i protocolli
 - C** chiedere supervisione per attività nuove o con limitata casistica
 - D** rispettare gli ordini impartiti dal personale medico
-

15 Come si definisce la violazione commessa dall'operatore sanitario che altera una cartella clinica?

- A** Falso di referto medico
 - B** Falso materiale
 - C** Falso d'ufficio interno
 - D** Falso formale
-

16 Indicare, tra le seguenti affermazioni, quella corretta in caso di dolore cronico.

- A** I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) possono essere tranquillamente assunti da persone con alterata funzionalità renale
 - B** I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) somministrati in modo continuo non danneggiano la mucosa gastrica
 - C** I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) non possono essere somministrati a persone che assumono oppioidi
 - D** I FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei) devono essere somministrati in regime terapeutico che preveda dosi fisse e orari fissi
-

17 Quando il cittadino può accedere agli ambulatori e alle strutture private accreditate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio?

- A** Quando l'ASL non è in grado di soddisfare immediatamente la richiesta
 - B** Quando le strutture pubbliche non sono in grado di soddisfare la richiesta entro il termine stabilito dalla legge, previa autorizzazione del Comune
 - C** Il cittadino può accedervi liberamente e a sua scelta
 - D** Solo al mattino dalle ore 8:00 alle ore 10:00
-

18 Riferendosi alle attività svolte in collaborazione con il medico e riguardanti l'iter diagnostico e terapeutico, il d.m. 739/1994 stabilisce che l'infermiere:

- A** esegue le prescrizioni diagnostiche stabilite dal medico
 - B** garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche
 - C** prepara il paziente alle procedure terapeutiche
 - D** per le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, si avvale delle figure di supporto
-

19 Quale tra i seguenti è un effetto terapeutico dell'applicazione locale del freddo?

- A** Controlla il sanguinamento e il rilassamento muscolare
 - B** Diminuisce l'infiammazione accelerando i processi infiammatori e immunologici
 - C** Aumenta l'edema agendo sulla permeabilità capillare e venosa
 - D** Allevia il dolore diminuendo la velocità di conduzione nervosa
-

-
- 20 Una donna che **NON** ha mai partorito è definita:
- A** primigravida
 - B** nulligravida
 - C** primipara attempata
 - D** nullipara
-
- 21 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da varicella, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?
- A** Dovranno in ogni caso adottare solo le precauzioni standard e indossare guanti e camice nei contatti col malato
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato e, se non immuni, un filtrante facciale a protezione 2 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard, indossare guanti, camice e occhiali nei contatti col malato e, se non immuni, una mascherina protettiva e copriscarpe
 - D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
-
- 22 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale intermittente, quali interventi infermieristici dovranno essere eseguiti per prevenire il rischio di aspirazione?
- A** Controllare il corretto posizionamento della sonda prima della somministrazione, far mantenere la posizione di Fowler durante l'infusione dell'alimentazione e per almeno 30 minuti dopo la somministrazione
 - B** Controllare il corretto posizionamento della sonda prima, durante e dopo la somministrazione, far mantenere la posizione di Fowler durante l'infusione dell'alimentazione e la posizione supina per 10 minuti dopo la somministrazione
 - C** Controllare il corretto posizionamento della sonda dopo la somministrazione, far mantenere la posizione di Fowler durante l'infusione dell'alimentazione e per due ore dopo la somministrazione
 - D** Controllare il corretto posizionamento della sonda prima della somministrazione, far mantenere la posizione di Fowler durante l'infusione dell'alimentazione e la posizione supina per 20 minuti dopo la somministrazione
-
- 23 Il PICC, catetere centrale a inserzione periferica:
- A** non consente l'infusione di soluzioni ipertoniche (osmolarità superiore a 800 mOsm/litro)
 - B** può rimanere in sede al massimo 30 giorni
 - C** consente tutti gli utilizzi tipici dei cateteri venosi centrali
 - D** non consente la rilevazione della pressione venosa centrale (PVC)
-
- 24 Individuare, tra i seguenti, un possibile effetto indesiderato della somministrazione di clistere evacuativo.
- A** Iperglicemia transitoria
 - B** Crisi vagale
 - C** Cefalea
 - D** Bradipnea e sonnolenza
-
- 25 Indicare quale fra le seguenti manifestazioni cliniche **NON** è da considerarsi una complicanza cronica del diabete mellito.
- A** Vasculopatia
 - B** Neuropatia
 - C** Pancreatite
 - D** Nefropatia
-

26 Quale fra le seguenti NON è sede di iniezione intramuscolare?

- A** Periglutea
 - B** Deltoide
 - C** Ventroglutea
 - D** Rettofemorale
-

27 Nei pazienti in degenza protratta, la scala di Braden:

- A** dovrebbe essere rivalutata soltanto una volta al mese
 - B** dovrebbe essere rivalutata almeno una volta ogni due settimane
 - C** dovrebbe essere rivalutata ogni sette giorni, ogniqualvolta le condizioni del paziente si modificano e alla dimissione
 - D** non dovrebbe essere rivalutata
-

28 L'irrigazione di una ferita si effettua utilizzando:

- A** siringa da 35 ml e ago da 19 G
 - B** siringa da 15 ml e ago da 19 G
 - C** siringa da 5 ml e ago da 23 G
 - D** siringa da 35 ml e ago da 23 G
-

29 Tutte le seguenti sono complicanze post-operatorie precoci, TRANNE:

- A** la trombosi
 - B** le infezioni
 - C** l'embolia
 - D** l'ipopotassiemia
-

30 Al momento della procedura assistenziale di posizionamento del catetere vescicale, la posizione da far assumere a un paziente di sesso femminile è:

- A** decubito dorsale con gambe flesse
- B** decubito laterale con gambe flesse
- C** decubito laterale con una gamba flessa sul lettino e l'altra gamba ipertesa
- D** decubito dorsale con gambe iperestese

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

31 Secondo la Costituzione italiana, la salute:

- A** è un bene fondamentale del singolo individuo
- B** è la semplice assenza di malattia
- C** non può essere annoverata tra i diritti dell'individuo
- D** è un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività

-
- 32 Il termine "dispnea" significa:
- A** frequenza respiratoria aumentata
 - B** difficoltà respiratoria: il paziente può riferire fame d'aria o fiato corto
 - C** frequenza respiratoria diminuita
 - D** assenza di respiro dovuta a un atto volontario