

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti nel Profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

PROVA SCRITTA – PROVA 09

NON STRAPPARE

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

-
- 1 **La posizione consigliata per la persona con shock ipovolemico è:**
- A** supina con arti inferiori sollevati
 - B** semiseduta, con testa e piedi sollevati
 - C** anti-Trendelenburg
 - D** supina con la testa a livello dei piedi
-
- 2 **Secondo il d.m. 739/1994, l'infermiere può contribuire alla formazione del personale di supporto?**
- A** No, mai
 - B** Sì, sempre
 - C** Sì, ma solo in caso di carenze della struttura preposta
 - D** Sì, ma solo per le attività riabilitative
-
- 3 **Quando si posiziona un catetere venoso periferico la rimozione del laccio emostatico avviene:**
- A** prima della rimozione del mandrino
 - B** dopo la rimozione del mandrino
 - C** dopo aver collegato la linea infusoriale
 - D** dopo avere effettuato il lavaggio con soluzione fisiologica
-
- 4 **Lo svuotamento manuale dell'ampolla rettale è una procedura invasiva che consente l'evacuazione di feci dal retto:**
- A** attraverso drenaggio aspirativo
 - B** con approccio chirurgico
 - C** attraverso tecnica endoscopica
 - D** utilizzando il dito indice della mano dominante
-
- 5 **In quale dei seguenti esami NON viene utilizzato un mezzo di contrasto?**
- A** Colangiografia
 - B** Arteriografia
 - C** Colangio-RM
 - D** Urografia
-
- 6 **L'estubazione del paziente nella sala operatoria comporta:**
- A** aumento del rischio di contaminazione batteriologica
 - B** sollevamento delle polveri ambientali
 - C** aumento delle concentrazioni ambientali di gas anestetici
 - D** ridotta pressione del gettito dell'ossigeno
-
- 7 **Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale?**
- A** 5 ml
 - B** 7 ml
 - C** 3 ml
 - D** 9 ml

Indicare quale delle seguenti affermazioni rispetto alla palpazione come tecnica di esame fisico diretto è **ERRATA**.

- A** Per non creare disagio all'assistito, dovrebbe essere eseguita con le mani calde e con un tocco delicato
 - B** La palpazione profonda comporta la compressione di un'area a una profondità di 3-5 cm mediante l'uso delle dita della mano dominante
 - C** Permette di percepire a livello addominale suoni fisiologici di tipo timpanico in sede gastrica e di tipo ottuso a livello epatico
 - D** La palpazione profonda permette l'identificazione della sede e delle dimensioni degli organi e la presenza di eventuali masse anomale
-

9 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta **ERRATO** per prevenire la sindrome da rapido svuotamento gastrico?

- A** Preferire la somministrazione della dieta in bolo invece che in infusione continua
 - B** Somministrare gli alimenti lentamente o diminuire la velocità di infusione
 - C** Somministrare gli alimenti a temperatura ambiente, evitando le temperature estreme
 - D** Far mantenere all'assistito la posizione di semi-Fowler per un'ora dopo la somministrazione della dieta
-

10 Il lavaggio sociale delle mani:

- A** si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
 - B** non è necessario se si indossano i guanti
 - C** prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
 - D** si effettua solo dopo aver effettuato una medicazione
-

11 Per l'infermiere che assiste una persona con vomito a getto è prioritario:

- A** diminuirne l'idratazione
 - B** controllarne la diuresi oraria
 - C** valutarne frequentemente lo stato di coscienza
 - D** coprire la persona per evitare ipotermia
-

12 I farmaci **LASA** sono farmaci:

- A** con nomi o confezioni simili tra loro
 - B** a base di mesalazina
 - C** utilizzati nelle sperimentazioni cliniche
 - D** generici o equivalenti
-

13 Per un corretto posizionamento del sondino naso-gastrico bisogna predisporre, tra il materiale occorrente:

- A** strisce reattive o cartine al tornasole per il pH
 - B** lo sfigmomanometro
 - C** il pallone Ambu
 - D** una pinza Klemmer
-

-
- 14 Il carcinoma della cervice uterina si associa in più del 95% dei casi a infezione da:
- A** virus erpetico ottavo (HHV8)
 - B** virus di Epstein-Barr (EBV)
 - C** Papillomavirus umano (HPV)
 - D** Candida Albicans
-
- 15 Quali sono i livelli pressori che definiscono l'ipertensione arteriosa?
- A** Pressione sistolica > 120 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
 - B** Pressione sistolica < 120 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
 - C** Pressione sistolica > 140 mmHg e/o pressione diastolica > 90 mmHg
 - D** Pressione sistolica < 140 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
-
- 16 La temperatura rettale è normalmente:
- A** superiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare
 - B** inferiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
 - C** nessuna delle altre alternative è corretta
 - D** superiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
-
- 17 Quale dei seguenti cateteri vescicali è semirigido e ha un'angolazione di 30°?
- A** Foley
 - B** Tiemann
 - C** Nelaton
 - D** Foley con sonda termica
-
- 18 Per quale motivo è necessario far rimuovere alla persona le protesi dentarie mobili prima del suo ingresso in camera operatoria?
- A** Per evitare il rischio di caduta nel retrobocca/vie aeree/vie digestive con ostruzione delle stesse
 - B** Per evitare il rischio di caduta solo nelle vie digestive con ostruzione delle stesse
 - C** Per evitare il rischio di caduta nella cavità nasale con ostruzione della stessa
 - D** Per evitare il rischio di caduta in bocca/retrobocca ed espulsione delle protesi
-
- 19 Che cosa trasmettono le goccioline di Flügge?
- A** Infezioni respiratorie
 - B** Sifilide
 - C** Toxoplasmosi
 - D** Infezioni uro-genitali
-
- 20 Quale delle seguenti sostanze NON è un disinfettante?
- A** Polivinilpirrolidone-iodio
 - B** Perossido di idrogeno
 - C** Benzalconio cloruro
 - D** Soluzione di cloruro di sodio al 9%

Quale metodica va seguita per la medicazione di una ferita asettica?

- A** La medicazione deve essere eseguita partendo dal centro della ferita sino alla periferia
 - B** La medicazione deve essere eseguita partendo dalla periferia della ferita sino al centro
 - C** La medicazione può essere eseguita in qualsiasi modo: è sufficiente che vengano utilizzati guanti sterili e disinfettanti non alcolici
 - D** La medicazione delle ferite asettiche deve essere eseguita solo dal personale medico negli ambienti specificatamente predisposti
-

22 Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione del dolore?

- A** Conley
 - B** VaS
 - C** Norton
 - D** Ramsay
-

23 Per "accreditamento" si intende:

- A** un processo di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Privato
 - B** un sistema di requisiti minimi stabiliti da enti privati accreditati esteri
 - C** un processo di sola verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale
 - D** un processo di valutazione e di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale
-

24 Nell'attività d'équipe, la responsabilità penale ricade:

- A** nessuna delle altre alternative è corretta
 - B** sull'operatore che ha causato il danno
 - C** su ogni singolo componente, poiché è strettamente personale e individuale
 - D** solo sul capo-équipe e sui medici a lui più vicini
-

25 Secondo il Codice deontologico, in caso di calamità, l'infermiere:

- A** è autorizzato a praticare un ALS
 - B** deve contattare subito i parenti dei pazienti
 - C** deve contattare subito le forze dell'ordine
 - D** si mette a disposizione dell'autorità competente
-

26 Dopo il livello sacrale, le sedi più frequenti di comparsa di lesioni da compressione sono:

- A** grande trocantere, tuberosità ischiatiche e talloni
 - B** tuberosità ischiatiche e regione rotulea
 - C** scapole e lobi dell'orecchio
 - D** solo i lobi dell'orecchio
-

- 27 **Quale tecnica dev'essere utilizzata per l'igiene delle orecchie?**
- A** Lasciare nel padiglione auricolare dei batuffoli imbibiti da ipoclorito di sodio
 - B** Usare un bastoncino cotonato e detergere padiglione auricolare e condotto uditivo
 - C** Usare una salvietta ripiegata sul dito, tirando il padiglione auricolare verso il basso
 - D** Applicare una crema sciogli-cerume nel condotto auricolare

- 28 **L'analgesia controllata dal paziente (PCA) permette l'autosomministrazione del farmaco per alleviare il dolore. Quale informazione occorre fornire all'assistito per insegnarne l'utilizzo?**
- A** Dopo la somministrazione è programmato un periodo di blocco di 4-6 ore
 - B** Dopo la somministrazione è programmato un periodo di blocco di alcuni minuti
 - C** Mantenere la posizione supina per almeno un'ora dopo la somministrazione
 - D** Premere il pulsante esclusivamente se il dolore è severo (NRS > 7)

- 29 **Una persona affetta da diabete di tipo 2 in terapia con metformina potrebbe avvertire i seguenti effetti collaterali:**
- A** aumento del peso corporeo
 - B** lipodistrofie, in particolar modo lipoipertrofie
 - C** disturbi gastrointestinali, per esempio diarrea
 - D** ipoglicemia notturna o prima dei pasti

- 30 **Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da legionellosi, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?**
- A** Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in quanto la malattia non è trasmessa da persona a persona
 - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e filtrante facciale a protezione 10 nei contatti con il malato
 - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, filtrante facciale a protezione 10 e occhiali nei contatti con il malato
 - D** Non dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato

QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.

- 31 **Il Servizio Sanitario Nazionale si fonda:**
- A** sulla competizione con le strutture private
 - B** sul concetto di SSN come unico fornitore di prestazioni sanitarie
 - C** sul principio dell'universalità delle cure
 - D** sul coinvolgimento delle assicurazioni

- 32 **In quale sede di rilevazione la temperatura è più alta?**
- A** Ascellare
 - B** Rettale
 - C** Auricolare
 - D** Orale

Robert Voluntas