



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
di n. 2 posti nel Profilo professionale di  
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –  
Cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda  
Ospedaliero Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara**

**PROVA SCRITTA – PROVA 07**

**NON STRAPPARE**

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA  
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**

---

1 Il lavaggio delle mani mira specificamente a prevenire:

- A** le infezioni respiratorie
  - B** la trasmissione di tutti gli agenti virali
  - C** la trasmissione delle malattie infettive ematologiche
  - D** le infezioni ospedaliere
- 

2 Quale tra i seguenti principi attivi è un antiemetico?

- A** Nimesulide
  - B** Furosemide
  - C** Metoclopramide
  - D** Metformina
- 

3 Per "deiscenza di una ferita" si intende:

- A** apertura o mancata chiusura delle labbra della ferita stessa
  - B** una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
  - C** una ferita che presenta cellule morte
  - D** una ferita che presenta adesioni con superfici contigue
- 

4 Quali caratteristiche deve avere un sapone utilizzato per il lavaggio di un paziente ospedalizzato?

- A** Possono essere utilizzati tutti i tipi di saponi
  - B** PH neutro, poco schiumogeno, facile da risciacquare, non profumato, costo contenuto
  - C** PH leggermente basico per migliorare la disidratazione cutanea, facile da risciacquare, non profumato
  - D** Solo pH neutro e basso costo
- 

5 Che cosa trasmettono le goccioline di Flügge?

- A** Toxoplasmosi
  - B** Sifilide
  - C** Infezioni respiratorie
  - D** Infezioni uro-genitali
- 

6 L'estubazione del paziente nella sala operatoria comporta:

- A** aumento delle concentrazioni ambientali di gas anestetici
  - B** sollevamento delle polveri ambientali
  - C** aumento del rischio di contaminazione batteriologica
  - D** ridotta pressione del gettito dell'ossigeno
- 

7 Quale posizione si deve far adottare sul lettino operatorio a un paziente candidato a un intervento di chirurgia toracica?

- A** Posizione supina con gli arti inferiori divaricati
  - B** Posizione litotomica
  - C** Posizione laterale
  - D** Posizione prona
-

---

Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta **ERRATO** per prevenire la sindrome da rapido svuotamento gastrico?

- A** Somministrare gli alimenti a temperatura ambiente, evitando le temperature estreme
  - B** Somministrare gli alimenti lentamente o diminuire la velocità di infusione
  - C** Preferire la somministrazione della dieta in bolo invece che in infusione continua
  - D** Far mantenere all'assistito la posizione di semi-Fowler per un'ora dopo la somministrazione della dieta
- 

9 Dopo il livello sacrale, le sedi più frequenti di comparsa di lesioni da compressione sono:

- A** solo i lobi dell'orecchio
  - B** tuberosità ischiatiche e regione rotulea
  - C** scapole e lobi dell'orecchio
  - D** grande trocantere, tuberosità ischiatiche e talloni
- 

10 In quali delle seguenti cavità corporee è possibile effettuare la rilevazione della temperatura corporea interna?

- A** Solo auricolare
  - B** Inguinale e vaginale
  - C** Ascellare, auricolare, inguinale
  - D** Orale, rettale, auricolare, vaginale
- 

11 Il carcinoma della cervice uterina si associa in più del 95% dei casi a infezione da:

- A** Candida Albicans
  - B** virus di Epstein-Barr (EBV)
  - C** virus erpetico ottavo (HHV8)
  - D** Papillomavirus umano (HPV)
- 

12 Per "accreditamento" si intende:

- A** un processo di valutazione e di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale
  - B** un sistema di requisiti minimi stabiliti da enti privati accreditati esteri
  - C** un processo di sola verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale
  - D** un processo di verifica periodica del possesso di una serie di requisiti predeterminati da parte di Aziende Sanitarie pubbliche e private che vogliono esercitare attività sanitarie nell'ambito del Sistema Sanitario Privato
- 

13 Secondo il Profilo professionale dell'Infermiere (d.m. 739/1994), l'infermiere:

- A** contribuisce alla formazione del personale di supporto e degli studenti
  - B** contribuisce alla formazione degli studenti
  - C** contribuisce alla formazione del personale di supporto
  - D** non contribuisce alla formazione di altre figure
-

- 
- 14 Tra le seguenti, la procedura diagnostica che utilizza isotopi radioattivi è:
- A** la risonanza magnetica
  - B** la scintigrafia
  - C** la miografia
  - D** la tomografia assiale computerizzata
- 
- 15 Per un corretto posizionamento del sondino naso-gastrico bisogna predisporre, tra il materiale occorrente:
- A** strisce reattive o cartine al tornasole per il pH
  - B** lo sfigmomanometro
  - C** il pallone Ambu
  - D** una pinza Klemmer
- 
- 16 Quale tecnica dev'essere utilizzata per l'igiene delle orecchie?
- A** Usare un bastoncino cotonato e detergere padiglione auricolare e condotto uditivo
  - B** Usare una salvietta ripiegata sul dito, tirando il padiglione auricolare verso il basso
  - C** Lasciare nel padiglione auricolare dei batuffoli imbibiti da ipoclorito di sodio
  - D** Applicare una crema sciogli-cerume nel condotto auricolare
- 
- 17 Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione del dolore?
- A** VaS
  - B** Conley
  - C** Norton
  - D** Ramsay
- 
- 18 Lo svuotamento manuale dell'ampolla rettale è una procedura invasiva che consente l'evacuazione di feci dal retto:
- A** attraverso tecnica endoscopica
  - B** con approccio chirurgico
  - C** utilizzando il dito indice della mano dominante
  - D** attraverso drenaggio aspirativo
- 
- 19 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da meningite meningococcica, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?
- A** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare una mascherina protettiva prima dell'ingresso nella stanza di degenza
  - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso e occhiali nei contatti col malato
  - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso e filtrante facciale a protezione 10 prima dell'ingresso nella stanza di degenza
  - D** Non sono necessari dispositivi di protezione individuale in quanto per questa malattia non esiste la trasmissione interumana
-

---

Una persona affetta da diabete di tipo 2 in terapia con metformina potrebbe avvertire i seguenti effetti collaterali:

- A** aumento del peso corporeo
  - B** lipodistrofie, in particolar modo lipoipertrofie
  - C** disturbi gastrointestinali, per esempio diarrea
  - D** ipoglicemia notturna o prima dei pasti
- 

21 L'unità di misura del catetere è:

- A** Charrière e corrisponde al diametro interno del catetere
  - B** Cartier e corrisponde al diametro esterno del catetere
  - C** Cartier e corrisponde al diametro interno del catetere
  - D** Charrière e corrisponde al diametro esterno del catetere
- 

22 Indicare quale delle seguenti affermazioni rispetto alla palpazione come tecnica di esame fisico diretto è ERRATA.

- A** La palpazione profonda permette l'identificazione della sede e delle dimensioni degli organi e la presenza di eventuali masse anomale
  - B** La palpazione profonda comporta la compressione di un'area a una profondità di 3-5 cm mediante l'uso delle dita della mano dominante
  - C** Per non creare disagio all'assistito, dovrebbe essere eseguita con le mani calde e con un tocco delicato
  - D** Permette di percepire a livello addominale suoni fisiologici di tipo timpanico in sede gastrica e di tipo ottuso a livello epatico
- 

23 Assistendo una persona con dolore, dopo quanto tempo dalla somministrazione della terapia antalgica per via endovenosa occorre rivalutare il sintomo?

- A** 15-30 minuti
  - B** 12 ore
  - C** 4 ore
  - D** Immediatamente
- 

24 La medicazione di un catetere venoso centrale deve essere effettuata passando la soluzione disinfettante:

- A** dall'esterno verso l'interno a raggiera
  - B** dall'esterno verso l'interno in modo circolare
  - C** dall'interno verso l'esterno in modo circolare
  - D** dall'interno verso l'esterno a raggiera
- 

25 Secondo il Codice deontologico dell'Infermiere, l'infermiere informa, coinvolge, educa e supporta:

- A** l'interessato e, con il suo libero consenso, le figure assistenziali di riferimento indicate dalla struttura ospedaliera
- B** esclusivamente l'interessato
- C** esclusivamente le persone di riferimento
- D** l'interessato e, con il suo libero consenso, le persone di riferimento

- 
- 26 Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale?
- A** 5 ml
  - B** 7 ml
  - C** 3 ml
  - D** 9 ml
- 

- 27 Per l'infermiere che assiste una persona con vomito a getto è prioritario:
- A** valutarne frequentemente lo stato di coscienza
  - B** controllarne la diuresi oraria
  - C** diminuirne l'idratazione
  - D** coprire la persona per evitare ipotermia
- 

- 28 Se un infermiere commette un errore durante il turno di lavoro in ospedale e ne deriva una lesione e quindi un danno al paziente, in ambito penale:
- A** l'infermiere risponderà personalmente di quanto derivato
  - B** risponderà il medico responsabile della struttura ove lavorava l'infermiere
  - C** pagheranno entrambe le assicurazioni, quella dell'ospedale e quella dell'infermiere, in parti eguali
  - D** il danno residuo verrà pagato dall'assicurazione dell'ospedale
- 

- 29 Quali possono essere le complicanze post-operatorie precoci dopo il confezionamento di una tracheostomia?
- A** Ostruzione/dislocazione della cannula, emorragia
  - B** Nessuna delle altre alternative è corretta
  - C** Dislocazione della cannula, ipertensione arteriosa polmonare
  - D** Dislocazione della cannula, ipertensione arteriosa
- 

- 30 Quali sono i livelli pressori che definiscono l'ipertensione arteriosa?
- A** Pressione sistolica < 140 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
  - B** Pressione sistolica < 120 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
  - C** Pressione sistolica > 120 mmHg e pressione diastolica > 80 mmHg
  - D** Pressione sistolica > 140 mmHg e/o pressione diastolica > 90 mmHg
- 

**QUESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.**

---

- 31 In quale sede di rilevazione la temperatura è più alta?
- A** Auricolare
  - B** Ascellare
  - C** Rettale
  - D** Orale
-

---

2

In che anno è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale?

- A** 1999
- B** 1985
- C** 1992
- D** 1978

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  
di n. 2 posti nel Profilo professionale di  
Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere –  
Cat. D indetto in forma congiunta tra l’Azienda  
Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Ferrara**

**PROVA SCRITTA – PROVA 08**

**NON STRAPPARE**

**L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA  
DATO L'APPOSITO SEGNALE**



Prodotto con cellulosa certificata  
FSC

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

- 
- 1 **La persona diabetica in trattamento con ipoglicemizzanti orali dovrebbe effettuare l'autocontrollo glicemico:**
- A** almeno quattro o cinque volte nell'arco della giornata, se ha valori glicemici stabili
  - B** almeno 2-3 volte alla settimana, includendo una misurazione nella fase postprandiale
  - C** quotidianamente prima dei pasti e prima di andare a dormire
  - D** attraverso il rilievo della chetonuria
- 
- 2 **La temperatura rettale è normalmente:**
- A** nessuna delle altre alternative è corretta
  - B** inferiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
  - C** superiore di 0,5 °C rispetto alla temperatura ascellare
  - D** superiore di 1 grado rispetto alla temperatura ascellare
- 
- 3 **Secondo il d.m. 739/1994, l'infermiere può contribuire alla formazione del personale di supporto?**
- A** Sì, ma solo in caso di carenze della struttura preposta
  - B** No, mai
  - C** Sì, sempre
  - D** Sì, ma solo per le attività riabilitative
- 
- 4 **I farmaci LASA sono farmaci:**
- A** generici o equivalenti
  - B** a base di mesalazina
  - C** utilizzati nelle sperimentazioni cliniche
  - D** con nomi o confezioni simili tra loro
- 
- 5 **Se il paziente collabora durante il posizionamento del sondino naso-gastrico, mentre si inserisce il sondino nella narice gli si chiede di:**
- A** inclinare la testa leggermente indietro
  - B** inclinare la testa in avanti
  - C** inclinare la testa a sinistra
  - D** non inclinare la testa
- 
- 6 **Tra le seguenti opzioni, identificare quella in cui tutte e tre le patologie indicate sono trasmissibili per via aerea.**
- A** Morbillo, virus dell'epatite A, meningite
  - B** Morbillo, varicella, tubercolosi
  - C** Varicella, salmonella, meningite
  - D** Clostridium difficile, salmonella, varicella

---

**Rispetto alle tecniche di esame fisico diretto, la palpazione:**

- A** è l'inizio naturale dell'esame fisico ed è utilizzata per rilevare specifiche caratteristiche fisiche o comportamenti
  - B** è utilizzata per determinare la struttura, la sede, le dimensioni, la consistenza, le masse e i liquidi nei vari distretti corporei
  - C** comporta l'uso delle dita e delle mani per percuotere un'area al fine di produrre un suono ed evidenziare se le strutture sono solide oppure piene di aria o liquidi
  - D** è la rilevazione con l'udito dei suoni legati al movimento del corpo, tramite l'uso di un fonendoscopio
- 

**8 In quale dei seguenti esami NON viene utilizzato un mezzo di contrasto?**

- A** Colangio-RM
  - B** Arteriografia
  - C** Colangiografia
  - D** Urografia
- 

**9 L'analgesia controllata dal paziente (PCA) permette l'autosomministrazione del farmaco per alleviare il dolore. Quale informazione occorre fornire all'assistito per insegnarne l'utilizzo?**

- A** Premere il pulsante esclusivamente se il dolore è severo (NRS > 7)
  - B** Dopo la somministrazione è programmato un periodo di blocco di 4-6 ore
  - C** Mantenere la posizione supina per almeno un'ora dopo la somministrazione
  - D** Dopo la somministrazione è programmato un periodo di blocco di alcuni minuti
- 

**10 Quali item sono valutati dalla scala di Braden?**

- A** Percezione sensoriale, umidità della cute, attività motoria, nutrizione, frizione e scivolamento
  - B** Percezione sensoriale, secchezza delle mucose, attività motoria, nutrizione, temperatura basale
  - C** Umidità della cute, frizione e scivolamento, percezione sensoriale, pregresse lesioni da pressione
  - D** Nutrizione, pregresse lesioni da pressione, secchezza delle mucose, attività motoria, percezione sensoriale
- 

**11 Secondo le Linee Guida relative alle Precauzioni di Isolamento in Ospedale del CDC di Atlanta del 2007, nell'assistere una persona affetta da legionellosi, quali dispositivi di protezione individuale dovranno utilizzare gli operatori?**

- A** Non dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e camice monouso nei contatti col malato
  - B** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti e filtrante facciale a protezione 10 nei contatti con il malato
  - C** Dovranno adottare le precauzioni standard e indossare guanti, camice monouso, filtrante facciale a protezione 10 e occhiali nei contatti con il malato
  - D** Sono sufficienti le precauzioni standard: non sono necessari dispositivi di protezione individuale aggiuntivi in quanto la malattia non è trasmessa da persona a persona
- 

**12 Al rientro dalla sala operatoria dopo intervento per un'occlusione intestinale, l'infermiere effettua il primo controllo post-operatorio a una persona di 68 anni. Con quale frequenza è raccomandabile eseguire i successivi controlli dei parametri e delle condizioni cliniche del paziente?**

- A** Ogni ora per le successive 24 ore
  - B** Dopo un'ora e poi pressione arteriosa e frequenza cardiaca ogni 6 ore, emocromo a 6-8 ore dal rientro in reparto e, se le condizioni sono stabili, al bisogno
  - C** Ogni ora per le prime 4 ore e successivamente ogni 4 ore
  - D** Il paziente necessita per almeno 48 ore di una presenza costante che possa segnalare al personale ogni variazione utile dei parametri vitali
-

---

13 Solitamente in gravidanza diminuisce:

- A** la gittata cardiaca
  - B** la motilità gastrointestinale
  - C** la frequenza urinaria
  - D** l'acidità gastrica
- 

14 Quale metodica va seguita per la medicazione di una ferita asettica?

- A** La medicazione deve essere eseguita partendo dal centro della ferita sino alla periferia
  - B** La medicazione deve essere eseguita partendo dalla periferia della ferita sino al centro
  - C** La medicazione può essere eseguita in qualsiasi modo: è sufficiente che vengano utilizzati guanti sterili e disinfettanti non alcolici
  - D** La medicazione delle ferite asettiche deve essere eseguita solo dal personale medico negli ambienti specificatamente predisposti
- 

15 La posizione consigliata per la persona con shock ipovolemico è:

- A** semiseduta, con testa e piedi sollevati
  - B** supina con arti inferiori sollevati
  - C** anti-Trendelenburg
  - D** supina con la testa a livello dei piedi
- 

16 La manovra del "finger sweep" è da attuare, in un soggetto con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, solo nel caso in cui:

- A** il corpo estraneo sia visibile e vi siano due soccorritori
  - B** il corpo estraneo sia di materiale liquido
  - C** il corpo estraneo non sia visibile
  - D** il corpo estraneo sia visibile
- 

17 Il lavaggio sociale delle mani:

- A** non è necessario se si indossano i guanti
  - B** prevede che si tolgano anelli, braccialetti e orologio prima di lavarsi le mani
  - C** si effettua all'inizio e alla fine del turno di servizio
  - D** si effettua solo dopo aver effettuato una medicazione
- 

18 Quale delle seguenti sostanze NON è un disinfettante?

- A** Benzalconio cloruro
  - B** Perossido di idrogeno
  - C** Soluzione di cloruro di sodio al 9%
  - D** Polivinilpirrolidone-iodio
-

---

Per le strutture sanitarie che erogano prestazioni e servizi nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, l'istituto dell'accreditamento è:

- A** un vincolo normativo esclusivo per gli enti sanitari ecclesiastici
  - B** un vincolo normativo esclusivo per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Sociale
  - C** un atto volontaristico solo per le aziende appartenenti alle Regioni e Province autonome
  - D** un vincolo normativo introdotto dal d.lgs. 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni
- 

20 Indicare quali, tra i seguenti valori di Kaliemia, possono essere considerati normali nell'adulto.

- A** 3,5-5 mEq/L
  - B** 3,5-7 mEq/L
  - C** 3,5-6 mEq/L
  - D** 1,5-3,5 mEq/L
- 

21 Secondo il Codice deontologico, in caso di calamità, l'infermiere:

- A** deve contattare subito le forze dell'ordine
  - B** deve contattare subito i parenti dei pazienti
  - C** si mette a disposizione dell'autorità competente
  - D** è autorizzato a praticare un ALS
- 

22 Quale dei seguenti cateteri vescicali è semirigido e ha un'angolazione di 30°?

- A** Foley
  - B** Tiemann
  - C** Nelaton
  - D** Foley con sonda termica
- 

23 Per quale motivo è necessario far rimuovere alla persona le protesi dentarie mobili prima del suo ingresso in camera operatoria?

- A** Per evitare il rischio di caduta solo nelle vie digestive con ostruzione delle stesse
  - B** Per evitare il rischio di caduta nel retrobocca/vie aeree/vie digestive con ostruzione delle stesse
  - C** Per evitare il rischio di caduta nella cavità nasale con ostruzione della stessa
  - D** Per evitare il rischio di caduta in bocca/retrobocca ed espulsione delle protesi
- 

24 Che cosa è necessario fare per eseguire la rasatura della barba di un paziente ad alto rischio emorragico?

- A** Stendere la schiuma da barba, usare una lametta sterilizzata e radere contro la direzione della crescita del pelo
  - B** Scaldare la barba con un asciugamano caldo, stendere la schiuma da barba, usare una lametta monouso radendo nella direzione di crescita del pelo
  - C** Stendere la schiuma da barba, usare una lametta, tendere la pelle e radere con movimenti più ampi sul mento e stretti sulle guance
  - D** Scaldare la barba con un asciugamano caldo, stendere la schiuma da barba, usare un rasoio elettrico, tendere la pelle e radere nella direzione di crescita del pelo
-

---

25 Nell'attività d'équipe, la responsabilità penale ricade:

- A** solo sul capo-équipe e sui medici a lui più vicini
- B** sull'operatore che ha causato il danno
- C** nessuna delle altre alternative è corretta
- D** su ogni singolo componente, poiché è strettamente personale e individuale

---

26 In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con angolatura di 10-15 gradi?

- A** Iniezione intramuscolare con metodo a baionetta
- B** Iniezione intramuscolare
- C** Iniezione sottocutanea
- D** Iniezione intradermica

---

27 Durante l'assistenza infermieristica a una persona con nutrizione enterale, quale fra i seguenti interventi infermieristici risulta **ERRATO** per la prevenzione di crampi addominali, flatulenza e distensione gastrica?

- A** All'inizio della somministrazione, clampare la sonda gastrostomica o il sondino nasogastrico, rimuovere il tappo e successivamente connettere la siringa a cono centrale o il circuito
- B** A ogni somministrazione, riempire la siringa a cono centrale con la formula alimentare, rimuovendo eventuali bolle d'aria formatesi durante l'aspirazione della stessa
- C** Al termine della somministrazione, eseguire il lavaggio del lume, clampare la sonda e solo successivamente disconnettere la siringa o il circuito
- D** Al termine dell'alimentazione eseguire un lavaggio del lume della sonda, disconnettere la siringa e solo successivamente clampare la sonda

---

28 Quando si posiziona un catetere venoso periferico la rimozione del laccio emostatico avviene:

- A** prima della rimozione del mandrino
- B** dopo la rimozione del mandrino
- C** dopo aver collegato la linea infusoriale
- D** dopo avere effettuato il lavaggio con soluzione fisiologica

---

29 Una lesione da decubito al primo stadio prevede:

- A** un eritema reattivo
- B** un eritema persistente alla digitopressione
- C** la rimozione solo dell'epidermide
- D** una lesione di diametro inferiore ai 5 cm

---

30 Le feci acoliche sono feci:

- A** che vengono emesse in assenza di coliche addominali ma con dolori di tipo colico
- B** biancastre, tipiche di patologie epatiche
- C** biancastre, tipiche di patologie infettive
- D** che vengono emesse in concomitanza con coliche addominali

**ESITI DI RISERVA: è necessario rispondere anche alle seguenti due domande, che verranno valutate solo in caso di annullamento di una delle precedenti.**

---

- 31 Il Servizio Sanitario Nazionale si fonda:
- A** sulla competizione con le strutture private
  - B** sul concetto di SSN come unico fornitore di prestazioni sanitarie
  - C** sul principio dell'universalità delle cure
  - D** sul coinvolgimento delle assicurazioni
- 
- 32 La malattia che maggiormente predispone alle fratture nell'anziano è:
- A** l'IRA (insufficienza renale acuta)
  - B** l'ipertrofia prostatica
  - C** l'osteoporosi
  - D** la celiachia